


மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழக பொறியியற் பீட தமிழ் மாணவர்கள்
நடாத்தும் க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான 13^{வது}

முன்னோடிப் பரீட்சை 2022
10(I) - இணைந்தகணிதம் I
விடைகள் (புள்ளியிடும் திட்டம்)



Prepared By
P.Senthilnathan B.Sc, Dip in Ed



MR.P.SENTHILNATHAN | COMBINED MATHEMATICS I
MORA E-TAMILS | EXAMINATION COMMITTEE



- 1) கணிதத்தொகுத்தறிவுக்கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எல்லா $n \in \mathbb{Z}^+$ இற்கும் $\sum_{r=1}^n (3r-1) = \frac{n(3n+1)}{2}$ என நிறுவுக.

$$\sum_{r=1}^n (3r-1) = \frac{n(3n+1)}{2}$$

$$n=1 \text{ எனின் } L: H: S = \sum_{r=1}^1 (3r-1) = 3 \times 1 - 1 = 2, R: H: S = 1 \times \frac{4}{2} = 2$$

$$L: H: S = R: H: S$$

05

$\therefore n=1$ இற்கு முடிவு உண்மை

யாதும் நேர்நிறை எண் $n=p$ இற்கு முடிவு உண்மை என்க

$$\text{அதாவது } \sum_{r=1}^p (3r-1) = \frac{p(3p+1)}{2}$$

05

$$n=p+1 \text{ எனில் } \sum_{r=1}^{p+1} (3r-1) = \sum_{r=1}^p (3r-1) + 3(p+1)$$

05

$$= \frac{p(3p+1)}{2} + (3p+2); \text{ from (1)}$$

$$= \frac{3p^2 + 7p + 4}{2}$$

$$\sum_{r=1}^{p+1} (3r-1) = \frac{(p+1)^2 (3p+4)}{2} = \frac{(p+1)(3p+1+1)}{2}$$

05

$\therefore n=p+1$ இற்கும் முடிவு உண்மை.

$\therefore n$ இன் எல்லா நேர்நிறை எண்களிற்ும் இம்முடிவு கணிதத்தொகுத்தறிவு முறையில் உண்மையாகும்.

05

- 2) ஒரே வரிப்படத்தில் $y = |x-2|, y = 4 - |x-2|$ ஆகியவற்றின் வரைபுகளை பரும்படியாகவரைக. இதிலிருந்து அல்லது வேறுவிதமாக, சமனிலி $|x+2| < 2$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் எல்லா மெய்பெறுமானங்களின் வீச்சைக் காண்க.

$$y = |x-2|, y = 4 - |x-2|$$

ஒரு வெட்டுப்புள்ளியின் x - ஆள்கூறு $x=0$

மற்றைய வெட்டுப்புள்ளியின்

x - ஆள்கூறு $x > 2$ இற்கு

$$x-2 = 4 - (x-2) \Rightarrow x = 4$$

05

தரப்பட்ட சமனிலி $|x+2| < 1$

$$\Rightarrow |-t+2| < 2; x = -t \text{ என்க.}$$

$$\Rightarrow |t-2| < 2$$

05


$$\Rightarrow 2|t-2| < 4 - |t-2|$$

$$\Rightarrow 0 < t < 4; \text{ from Graph}$$

$$\Rightarrow 0 < -x < 4$$

$$\Rightarrow -4 < x < 0$$

05



- 3) Z_1, Z_2 ஆகிய சிக்கல் எண்கள் $Z_1 = 1 + i, |Z_2| = 2\sqrt{2}$ ஆகுமாறுள்ளன. $Z = 4Z_1 + Z_2$ ஆல் வரையறுக்கப்படும் சிக்கல் எண் Z இன் ஒழுக்கை கண்டு, அதை ஆகண் வரிப்படத்தில் பரும்படியாக வரைக. இதிலிருந்து $\text{Arg}Z$ இன் இழிவுப் பெறுமானத்தைக் காண்க.

$$Z_1 = 1 + i, |Z_2| = 2\sqrt{2}, Z = x + iy \text{ என்க} \Rightarrow p(x, y)$$

$$Z = 4Z_1 + Z_2$$

$$\Rightarrow Z_2 = Z - 4Z_1$$

$$= (x + iy) - 4(1 + i)$$

$$Z_2 = (x - 4) + i(y - 4) \quad [05]$$

$$\Rightarrow |Z_2| = \sqrt{(x - 4)^2 + (y - 4)^2}$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{2} = \sqrt{(x - 4)^2 + (y - 4)^2}$$

$$\Rightarrow (x - 4)^2 + (y - 4)^2 = (2\sqrt{2})^2 \quad [05]$$

$$\text{மையம் } (4, 4) \text{ ஆரை} = 2\sqrt{2}$$

ΔOCP_0 இல்

$$\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{4\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$


$$\Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \quad [05]$$

புள்ளி P_0 இல் Z இருக்கும் போதே $\text{Arg}Z$ இழிவாகும்.

$$(\text{Arg}Z)_{\min} = \frac{\pi}{4} - \alpha$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \quad [05]$$

$$= \frac{\pi}{12}$$



- 4) $a \in \mathbb{R}$ ஆயிருக்க $\left(x^3 + \frac{a}{x}\right)^4, \left(2x^4 - \frac{1}{x}\right)^5$ என்பற்றின் ஈருறுப்பு விரியில் உள்ள x ஐ சாராத உறுப்புகளின் விகிதம் முறையே 16:5 ஆக இருப்பின் $a = 2$ எனக்காட்டுக.

$$\left(x^3 + \frac{a}{x}\right)^4 \Rightarrow T_{r+1} = {}^4C_r (x^3)^{4-r} \left(\frac{a}{x}\right)^r = ({}^4C_r a^r) x^{12-4r} \quad [05]$$

$$12 - 4r = 0 \Rightarrow 3 = r \Rightarrow T_4 = {}^4C_3 a^3 = 4a^3 \quad [05]$$

$$\left(2x^4 - \frac{1}{x}\right)^5 \Rightarrow T_{r+1} = {}^5C_r (2x^4)^{5-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = {}^5C_r 2^{5-r} (-1)^r x^{20-5r} \quad [05]$$

$$20 - 5r = 0 \Rightarrow r = 4 \Rightarrow T_5 = {}^5C_4 2^1 \times 1 = 10 \quad [05]$$

$$\therefore \frac{4a^3}{10} = \frac{16}{5} \Rightarrow a^3 = 2^3 \Rightarrow a = 2 \quad [05]$$

5) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\cot x - \tan x)(\sin x - \cos x)}{(1 - \tan^3 x)\left(x - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ எனக் காட்டுக.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\cot x - \tan x)(\sin x - \cos x)}{(1 - \tan^3 x)\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\left(\frac{1}{\tan x} - \tan x\right) \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x\right)}{(1 - \tan^3 x) \left(x - \frac{\pi}{4}\right)}$$

05

$$= \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(1 - \tan^2 x) \left(\sin x \cos \frac{\pi}{4} - \cos x \sin \frac{\pi}{4}\right)}{\tan x (1 - \tan^3 x) \left(x - \frac{\pi}{4}\right)}$$

$$= \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(1 - \tan x)(1 + \tan x) \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{\tan x (1 - \tan x)(1 + \tan x + \tan^2 x) \left(x - \frac{\pi}{4}\right)}$$

05

$$= \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left[\frac{(1 + \tan x)}{\tan(1 + \tan x + \tan^2 x)} \right] \times \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}$$

05

$$= \sqrt{2} \times \frac{2}{1 \times 3} \times 1$$


05

$$= \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

- 6) $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $y = 0$, $x = \sqrt{3}$ ஆகிய வளைவிகளினால் உள்ளடைக்கப்படும் பிரதேசம் S இன் பரப்பளவு 1 சதுர அலகுகள் எனக் காட்டுக. பிரதேசம் S ஆனது x- அச்சப்பற்றி 2π ஆரையன்களினூடு சுற்றப் பெறப்படும் திண்மத்தின் கனவளவை $\sqrt{3}\pi - \frac{\pi^2}{3}$ எனக்காட்டுக.

$$\begin{aligned} \text{பரப்பு } S &= \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{3}} (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \Big|_0^{\sqrt{3}} = 2 - 1 = 1 \end{aligned}$$

05



$$\begin{aligned}
\text{கனவளவு} &= \int_0^{\sqrt{3}} \pi \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)^2 dx \quad \boxed{05} \\
&= \pi \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{1+x^2} dx \\
&= \pi \int_0^{\sqrt{3}} \frac{(1+x^2)-1}{1+x^2} dx \\
&= \pi \left\{ \int_0^{\sqrt{3}} 1 dx - \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2} dx \right\} \\
&= \pi \left\{ [x]_0^{\sqrt{3}} - [\tan^{-1} x]_0^{\sqrt{3}} \right\} \quad \boxed{05} \\
&= \pi \left\{ (\sqrt{3}-0) - \left(\frac{\pi}{3} - 0 \right) \right\} \\
&= \frac{\pi(3\sqrt{3}-\pi)}{3} \quad \boxed{05}
\end{aligned}$$

- 7) நீள்வளையம் ஒன்றின் பரமானச்சமன்பாடு $x = 2 \cos \theta, y = \sqrt{3} \sin \theta$ என்பதால் தரப்படுகிறது. இங்கு θ மெய்ப்பரமானம் $\theta = \frac{\pi}{3}$ இல் தொடலியின் சமன்பாடு $x + 2y - 4 = 0$ எனக்காட்டுக. $\theta = \frac{\pi}{3}$ இல் செவ்வனின் சமன்பாட்டைக்கண்டு, அச்செவ்வனானது நீள்வளையத்தை சந்திக்கும் வேறொரு புள்ளியின் பரமானப்பெறுமானம் α ஆனது $8 \cos \alpha - 2\sqrt{3} \sin \alpha = 1$ ஐ திருப்தி செய்யும் எனக்காட்டுக.

$$x = 2 \cos \theta \Rightarrow \frac{dx}{d\theta} = -2 \sin \theta$$

$$y = \sqrt{3} \sin \theta \Rightarrow \frac{dy}{d\theta} = \sqrt{3} \cos \theta$$

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dx} \\
&= \left(\frac{dy}{d\theta} \right) \cdot \left(\frac{1}{\frac{dx}{d\theta}} \right)
\end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{3} \cos \theta}{-2 \sin \theta}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cot \theta \quad \boxed{05}$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\theta=\frac{\pi}{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cot \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$x = 2 \cos \theta, y = \sqrt{3} \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = 1, y = \frac{3}{2} \Rightarrow P(1, \frac{3}{2}) \quad \boxed{05}$$

P யில் தொடலியின் சமன்பாடு

$$\frac{y - \frac{3}{2}}{x - 1} = -\frac{1}{2}$$

$$2y - 3 = -x + 1$$

$$\Rightarrow x + 2y - 4 = 0 \quad \boxed{05}$$

$$\theta = \alpha \text{ இல் } Q \equiv (2 \cos \alpha, \sqrt{3} \sin \alpha)$$

P யில் தொடலியின் சமன்பாடு

$$\frac{y - \frac{3}{2}}{x - 1} = 2$$

$$4x - 2y - 1 = 0 \quad \boxed{05}$$

$$(2 \cos \alpha, \sqrt{3} \sin \alpha) \Rightarrow 8 \cos \alpha - 2\sqrt{3} \sin \alpha = 1 \quad \boxed{05}$$

- 8) $\lambda \in \mathbb{Z}$ ஆயிருக்க $P(\lambda, 2\lambda - 1)$ இற்கூடாகச் செல்லும் படித்திறன் $\frac{1}{2}$ ஐ உடையதுமான கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க. இக்கோடு x, y அச்சுக்களை முறையே A, B எனும் புள்ளிகளில் வெட்டின் $AB = \frac{\sqrt{5}}{2} |3\lambda - 2|$ எனக்காட்டுக. $AB = 2\sqrt{5}$ எனின் λ ஐக் கண்டு ΔAOB பரப்பு 4 சதுர அலகுகள் எனக்காட்டுக.

$$P \equiv (\lambda, 2\lambda - 1)$$

கோட்டின் சமன்பாடு

$$\frac{y - (2\lambda - 1)}{x - \lambda} = \frac{1}{2} \quad \boxed{05}$$

$$2y - 2(2\lambda - 1) = x - \lambda$$

$$x - 2y + (3\lambda - 2) = 0$$

$$y = 0 \Rightarrow x = -(3\lambda - 2) \Rightarrow A \equiv (-(3\lambda - 2), 0)$$

$$x = 0 \Rightarrow y = \frac{3\lambda - 2}{2} \Rightarrow B \equiv \left(0, \frac{3\lambda - 2}{2}\right) \quad \boxed{05}$$

$$AB = \sqrt{[-(3\lambda - 2)]^2 + \frac{(3\lambda - 2)^2}{4}}$$

$$AB = \frac{\sqrt{5}}{2} |3\lambda - 2| = 2\sqrt{5} \quad \boxed{05}$$

$$|3\lambda - 2| = 4$$

$$3\lambda - 2 = \pm 4$$

$$\left. \begin{array}{l} (+) \Rightarrow \lambda = 2 \\ (-) \Rightarrow \lambda = -\frac{2}{3} \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = 2, \because \lambda \in \mathbb{Z} \quad \boxed{05}$$

$$\lambda = 2 \Rightarrow A \equiv (-4, 0), B \equiv (0, 2)$$

$$\Delta AOB \text{ பரப்பு} = \frac{1}{2} \times |-4| \times 2 = 4 \quad \boxed{05}$$

- 9) $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$ எனும் வட்டத்தை $x + y - 3 = 0$ எனும் கோடு தொடும் எனக்காட்டி, தொடுபுள்ளியின் ஆள்கூறெக்காண்க. $x + y - 3 = 0$ இற்கு சமாந்தரமான வட்டத்திற்கான மற்றைய தொடலியின் சமன்பாடு $x + y - 7 = 0$ எனக்காட்டுக.

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$$

$$\text{மையம் } C \equiv (2,3)$$

$$\text{ஆரை } r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$$

$$= \sqrt{4 + 9 - 11} \quad \boxed{05}$$

$$r = \sqrt{2}$$

$$x + y - 3 = 0 \text{ இற்கு}$$

$$C(2,3) \text{ இல் இருந்தான } \perp \text{ தூரம் } = \frac{|2+3-3|}{\sqrt{1+1}} \quad \boxed{05}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$\therefore$ ஆரை $= \perp$ தூரம் $\Rightarrow$ தொடும்.

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$$

$$x + y - 3 = 0 \Rightarrow y = 3 - x$$

$$\therefore x^2 + (3-x)^2 - 4x - 6(3-x) + 11 = 0$$

$$\therefore x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 2 \quad \boxed{05}$$

$$N \equiv (1,2)$$


$$M \equiv (\bar{x}, \bar{y}) \text{ என்க } \Rightarrow \frac{\bar{x}+1}{2} = 2, \frac{\bar{y}+2}{2} = 3$$

$$\Rightarrow \bar{x} = 3, \bar{y} = 4 \Rightarrow M(3,4) \quad \boxed{05}$$

$$\text{மற்றைய தொடலி } x + y + \lambda = 0$$

$$(3,4) \Rightarrow \lambda = -7$$

$$\therefore x + y - 7 = 0 \quad \boxed{05}$$



- 10) $f(x) = 6 \cos^2 x + 16 \sin x \cos x - 6 \sin^2 x + 3$ எனக்கொள்வோம். $f(x)$ ஐ வடிவம் $a \cos(2x - \alpha) + b$ எனும் வடிவில் எடுத்துரைக்க. இங்கு $a(>0), b, \alpha \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ என்பன கணிக்கப்படவேண்டிய மாறிலிகள். $-7 \leq f(x) \leq 13$ என்பதை உய்த்தறிக.

$$f(x) = 6 \cos^2 x + 16 \sin x \cos x - 6 \sin^2 x + 3$$

$$= 6(\cos^2 x - \sin^2 x) + 16 \sin x \cos x + 3$$

$$= 6 \cos 2x + 8 \sin 2x + 3 \quad \boxed{05}$$

$$= 2(3 \cos 2x + 4 \sin 2x) + 3$$

$$= 2 \times 5 \left(\frac{3}{5} \cos 2x + \frac{4}{5} \sin 2x \right) + 3$$

$$= 10(\cos 2x \cos \alpha + \sin 2x \sin \alpha) + 3 \quad \text{இங்கு} \quad \begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{3}{5} \\ \sin \alpha &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$f(x) = 10 \cos(2x - \alpha) + 3$$

$$f(x) = 9 \cos(2x - \alpha) + b;$$

$$a = 10, \quad b = 3, \quad \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{3}{5} \right)$$

$$\boxed{05} \quad \boxed{05}$$

$$-1 \leq \cos(2x - \alpha) \leq 1 \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow -10 \leq 10 \cos(2x - \alpha) \leq 10$$

$$\Rightarrow -10 + 3 \leq 10 \cos(2x - \alpha) + 3 \leq 10 + 3$$

$$\Rightarrow -7 \leq f(x) \leq 13 \quad \boxed{05}$$



Inspire. Innovate. Engineer.

Undergraduate Degrees

Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Civil Engineering

Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Information and
communication engineering

Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Electronics
and Power Systems

Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Telecommunication
Engineering

Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Electronics and
Engineering Management

Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Mechatronics Engineering



School of
Engineering

www.sltc.ac.lk

0112 100 500



SLTC
Research University



RMIT University
RMIT Australia

- Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering
- Bachelor of Engineering (Hons) Civil & Infrastructure
- Bachelor of Engineering (Hons) Automotive Engineering
- Bachelor of Engineering (Hons) Aerospace Engineering
- Bachelor of Engineering (Hons) Advanced Manufacturing & Mechatronics

RMIT Vietnam

- Bachelor of Engineering (Hons) Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Engineering (Hons) Robotics and Mechatronics Engineering

DEAKIN University, Australia

- Bachelor of Civil Engineering (Hons)
- Bachelor of Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Mechatronics Engineering



Lancaster University, UK

- Bachelor of Engineering (Hons)



University of Auckland, New Zealand

- Bachelor of Engineering (Hons)

Deakin University CRICOS Provider Code 001138 | RMIT CRICOS Provider Code 00122A



Northway
Family Mart
Save Money. Live Better.



Uppumadam Junction, K.K.S Road,

Pirakanth

Photo Copy Centre



**School & Office
Stationary Items,
Photo Copy,
Colour Print,
Colour Photo Copy,
Binding, Laminating**

T.P: 077 223 8447

021 221 6828

Viber: 0776616153

Email: grpirakanth@gmail.com

**55, Palaly Road,
Thirunelvely,
Jaffna**

11)

a) இருபடிச்சமன்பாடொன்றின் மூலங்களின் பெருக்குத்தொகை மறையாக இருப்பின்

அச்சமன்பாடு மெய் மூலங்களையே கொண்டிருக்கும் எனக்காட்டுக.

$0 < k < 2$ எனின் $(k-2)x^2 - 2(k-1)x + k = 0$ எனும் சமன்பாடு மெய்மூலங்களைக் கொண்டிருக்கும் என உய்த்தறிக.

$0 < k < 2$ ஆயிருக்க $(k-2)x^2 - 2(k-1)x + k = 0$ என்பதன் மூலங்கள் முறையே α, β எனின் $|\alpha| + |\beta| = \frac{2}{2-k}$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து, $|\alpha|, |\beta|$ மூலங்களாக கொண்ட இருபடிச்சமன்பாட்டைக் காண்க.

$ax^2 + bx + c = 0$ என்க இங்கு $a, b, c \in \mathbb{R}$ with $a \neq 0$

மூலங்கள் (α, β)

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} < 0$$

$$\Rightarrow ac < 0 \Rightarrow -ac > 0 \quad \boxed{05}$$

$$\text{Consider } \Delta = b^2 - 4ac \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow \Delta > 0$$

$$\therefore \text{மூலங்கள் மெய்} \quad \boxed{05}$$

15

$$(k-2)x^2 - 2(k-1)x + k = 0 \rightarrow (\alpha, \beta)$$

$$\alpha + \beta = \frac{2(k-1)}{k-2}, \alpha\beta = \frac{k}{k-2}$$

05

05

$$0 < k < 2 \text{ எனின் } \frac{k}{k-2} < 0 \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow \alpha\beta < 0 \quad \boxed{05}$$

$$\therefore \text{மெய் மூலங்களை கொண்டிருக்கும்.} \quad \boxed{05}$$

25

$$\text{Consider } (|\alpha| + |\beta|)^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2|\alpha||\beta| \quad \boxed{05}$$

$$= \alpha^2 + \beta^2 + 2|\alpha\beta|$$

$$= \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta, \quad \because \alpha\beta < 0 \quad \boxed{05}$$

05

$$= (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta \quad \boxed{05}$$

$$= 4 \frac{(k-1)^2}{(k-2)^2} - \frac{4k}{k-2}$$

$$= \frac{4[(k-1)^2 - k(k-2)]}{(k-2)^2}$$

$$(|\alpha| + |\beta|)^2 = \frac{4 \times 1}{(k-2)^2} \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow |\alpha| + |\beta| = \frac{2}{|k-2|}, \quad \boxed{05} \quad \because |\alpha| + |\beta| > 0$$

$$= \frac{2}{-(k-2)}, \quad \because k < 2 \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow |\alpha| + |\beta| = \frac{2}{2-k}$$

$$|\alpha||\beta| = |\alpha\beta| = -\alpha\beta, \quad \because \alpha\beta < 0$$

$$= \frac{-k}{k-2}$$

$$|\alpha||\beta| = \frac{k}{2-k} \quad \boxed{05}$$

$\therefore |\alpha|, |\beta|$ ஐ மூலங்களாக கொண்ட சமன்பாடு

$$(x - |\alpha|)(x - |\beta|) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - (|\alpha| + |\beta|)x + |\alpha||\beta| = 0 \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{2}{2-k}x + \frac{k}{2-k} = 0 \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow (2-k)x^2 - 2x + k = 0$$

55

b) $f(x) = ax^2 + 2x + 2b$ எனவும் $g(x) = cx^2 + 2x + b$ எனவும் கொள்வோம். இங்கு $a, b, c \in \mathbb{R}$ ஆகும்.

$f(x)$ ஆனது $(x+1), (x-2)$ என்பவற்றால் வகுக்கப்படும் போது மீதிகள் முறையே $-6, 12$ ஆகவும்

$f(x) + g(x)$ என்னும் பல்லுறுப்பியிற்கு ஒரு காரணி $(x+2)$ எனவும் தரப்படின் a, b, c இன்

பெறுமானங்களைக் காண்க.

மேலும் a, b, c என்பவற்றின் இப்பெறுமானங்களுடன் எல்லா $x \in \mathbb{R}$ இற்கும் $f(x) \geq 3g(x)$ எனக்காட்டுக.

$$f(x) = ax^2 + 2x + 2b$$

$$(x+1) \text{ ஆல் வகுக்க மீதி } f(-1) = -6 \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow a \times (-1)^2 + 2 \times (-1) + 2b = -6$$

$$\Rightarrow a + 2b = -4 \quad \boxed{05}$$

.....(1)

$$(x-2) \text{ ஆல் வகுக்க மீதி } f(2) = 12 \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow a \times 2^2 + 2 \times 2 + 2b = 12$$

$$\Rightarrow 4a + 2b = 8 \quad \boxed{05}$$

.....(2)

$$(2) - (1) \Rightarrow 3a = 12$$

$$\Rightarrow a = 4 \quad \boxed{05}$$

$$(1) \rightarrow b = -4$$

$$g(x) = cx^2 + 2x + b$$

$$f(x) + g(x) = (a+c)x^2 + 4x + 3b \quad \boxed{05}$$

$$f(x) + g(x) = (4+c)x^2 + 4x - 12,$$

$$(x+2) \text{ ஆல் வகுக்க மீதி } f(2) + g(2) = 0, \therefore (x-2) \text{ காரணி}$$

$$\boxed{05}$$

$$\Rightarrow (4+c) \times (2)^2 + 4 \times (-2) - 12 = 0$$

$$4+c-2-3=0$$

$$\Rightarrow c=1 \quad \boxed{05}$$

$$\boxed{40}$$

$$\therefore a=4, b=-4, C=1$$

$$f(x) = 4x^2 + 2x - 8$$

$$g(x) = x^2 + 2x - 4$$

$$\text{Consider } f(x) - 3g(x) = 4x^2 + 2x - 8 - 3(x^2 + 2x - 4)$$

$$= x^2 - 4x + 4 \quad \boxed{05}$$

$$= (x-2)^2$$

$$\geq 0 \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow f(x) - 3g(x) \geq 0$$

$$\Rightarrow f(x) \geq 3g(x) \quad \boxed{05}$$

$$\boxed{15}$$

12)

a) SRINIVASA RAMANUJAN எனும் பெயரில் உள்ள எழுத்துக்களில் 5 எழுத்துக்களாக தெரிந்து ஆக்கப்படக்கூடிய 5 எழுத்துள்ள சொல்லில்,

i) 5 எழுத்துக்களும் வேறு வேறானவையாக இருப்பின்

ii) இரண்டு எழுத்துக்கள் A ஆயும், மற்றைய மூன்றும் A தவிர்ந்த வேறு

வேறானவையாயும் இருப்பின்

iii) A,N தவிர்ந்த எவையேனும் 5 எழுத்துக்களாயிருப்பின் அமைக்கத்தக்க சொற்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

SRINIVASA RAMANUJAN

S-2, R-2, I-2, N-3, V-1, A-5, M-1, U-1, J-1

$$\text{i. } {}^9P_5 = \frac{9!}{4!} = 15120 \quad \boxed{05}$$

$$\boxed{10}$$

$$\text{ii. } {}^8C_3 \times \frac{5!}{2!} = \frac{8!}{5! \times 3!} \times \frac{5!}{2!} = 3360 \quad \boxed{05}$$

$$\boxed{10}$$

iii.

வகை	சேர்மானம்	வரிசைமாற்றம்
X X o o √	${}^3C_2 \times {}^5C_1 = 15$ 05	$15 \left(\frac{5!}{2! \times 2!} \right) = 450$ 05
X X √ O □	${}^3C_1 \times {}^6C_3 = 60$ 05	$60 \left(\frac{5!}{2!} \right) = 3600$ 05
X √ O □ Δ	${}^7C_5 = 21$ 05	$21 \times 5! = 2520$ 05

$$\therefore \text{மொத்தம்} = 450 + 3600 + 2520$$

$$= 6570 \quad \boxed{10}$$

40

b) $r \in \mathbb{Z}^+$ இற்கு $U_r = \frac{7r^2 + 14r - 1}{(r+1)(r+2)}$ எனக் கொள்வோம்.

$r \in \mathbb{Z}^+$ இற்கு $U_r = \frac{Ar}{r+1} - \frac{Br+C}{r+2}$ ஆக இருக்கத்தக்கதாக A, B, C எனும் மாறிலிகளின் பெறுமானங்களைக் காண்க.

இதிலிருந்து $r \in \mathbb{Z}^+$ இற்கு $\frac{1}{8^r} U_r = f(r) - f(r+1)$ ஆகுமாறு $f(r)$ ஐக் கண்டு, $n \in \mathbb{Z}^+$

இற்கு $\sum_{r=1}^n \left(\frac{U_r}{8^r} \right) = \frac{1}{2} - \frac{(n+1)}{8^n(n+2)}$ எனக்காட்டுக.

முடிவில் தொடர் $\sum_{r=1}^{\infty} \left(\frac{U_r}{8^r} \right)$ ஒருங்குகிறது என உய்த்தறிந்து, அதன் கூட்டுத்தொகையைக் காண்க.

அத்துடன் $\frac{5}{12} \leq \sum_{r=1}^n \left(\frac{U_r}{8^r} \right) < \frac{1}{2}$ எனவும் காட்டுக.

$$U_r = \frac{7r^2 + 14r - 1}{(r+1)(r+2)} \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$U_r = \frac{Ar}{r+1} - \frac{Br+C}{r+2} \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$\Rightarrow \frac{7r^2 + 14r - 1}{(r+1)(r+2)} = \frac{Ar(r+2) - (Br+C)(r+1)}{(r+1)(r+2)}$$

$$\Rightarrow 7r^2 + 14r - 1 = Ar^2 + 2Ar - Br^2 - Br - Cr - C$$

$$\Rightarrow 7r^2 + 14r - 1 = (A-B)r^2 + (2A-B-C)r - C \quad \boxed{05}$$

$$[r^2] \Rightarrow 7 = A - B \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$[r] \Rightarrow 14 = 2A - B - C \quad \dots\dots\dots(4)$$

$$\text{மாறிலி} \Rightarrow -1 = -C \Rightarrow 1 = C \quad \boxed{05}$$

$$(4) \Rightarrow 15 = 2A - B$$

$$(4) - (3) \Rightarrow 8 = A$$

$$(3) \Rightarrow B = 1 \quad \boxed{05}$$

15

$$(2) \Rightarrow U_r = \frac{8r}{(r+1)} - \frac{r+1}{(r+2)} \quad \boxed{05}$$

$$\frac{U_r}{8^r} = \frac{r}{8^{r-1}(r+1)} - \frac{r+1}{8^r(r+2)} \quad \boxed{05}$$

$$\frac{U_r}{8^r} = f(r) - f(r+1); \text{ இல் } f(r) = \frac{r}{8^r(r+1)} \quad \boxed{05}$$

$$\frac{U_r}{8^r} = f(r) - f(r+1)$$

$$r=1 \Rightarrow \frac{U_1}{8^1} = f(1) - f(2) \quad \boxed{05}$$

$$r=2 \Rightarrow \frac{U_2}{8^2} = f(2) - f(3)$$

$$r=3 \Rightarrow \frac{U_3}{8^3} = f(3) - f(4)$$

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ r=n-1 \Rightarrow \frac{U_{n-1}}{8^{n-1}} = f(n-1) - f(n) \end{array}$$

$$r=n \Rightarrow \frac{U_n}{8^n} = f(n) - f(n+1)$$

$$\text{கூட்டி} \sum_{r=1}^n \frac{U_r}{8^r} = f(1) - f(n+1) \quad \boxed{05}$$

$$= \frac{1}{1 \times 2} - \frac{n+1}{8^n(n+2)} ; \text{ from (5)}$$

$$\sum_{r=1}^n \frac{U_r}{8^r} = \frac{1}{2} - \frac{n+1}{8^n(n+2)} \quad \boxed{05} \dots\dots\dots(6)$$

40

$$\sum_{r=1}^n \frac{U_r}{8^r} = \frac{1}{2} - \frac{1 + \frac{1}{n}}{8^n(1 + \frac{2}{n})} \quad \boxed{05}$$

$$n \rightarrow \infty \Rightarrow \sum_{r=1}^n \frac{U_r}{8^r} \rightarrow \frac{1}{2} \Rightarrow \text{ஒருங்குள்.} \quad \boxed{05}$$

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{U_r}{8^r} = \frac{1}{2} \quad \boxed{05}$$

$$\frac{U_r}{8^r} = \frac{7r^2 + 14r - 1}{8^r(r+1)(r+2)}$$

$$\frac{U_1}{8^1} = \frac{7+14-1}{8(2)(3)} = \frac{20}{8 \times 2 \times 3} = \frac{5}{12} \quad \boxed{05}$$

$$r \in \mathbb{Z}^+ \text{ இற்கு } \frac{U_r}{8^r} = \frac{7r^2 + 14r - 1}{8^r(r+1)(r+2)} > 0 \quad \boxed{05}$$

$$\frac{U_1}{8^1} \leq \sum_{r=1}^n \frac{U_r}{8^r} < \sum_{r=1}^{\infty} \frac{U_r}{8^r} \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{12} \leq \sum_{r=1}^n \frac{U_r}{8^r} < \frac{1}{2} \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{12} \leq \sum_{r=1}^n \frac{U_r}{8^r} < \frac{1}{2}$$

35

13)

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & b \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ எனக் கொள்வோம் இங்கு $a, b \in \mathbb{R}$.

$A^T B = C$ எனவும் கொள்வோம் $a = 2, b = 2$ எனக் காட்டுக.

$\lambda \in \mathbb{R}$ ஆயிருக்க தாயம் P ஆனது $P = A^T B + \lambda D$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ஆகும். λ இன் எப்பெறுமானத்திற்கும் P^{-1} உண்டு எனக்காட்டுக.

இப்போது $\lambda = 1$ எனக்கொள்வோம். P^{-1} ஐ எழுதி, இதிலிருந்து $EP = A^T B + 2D$ ஆகுமாறு 2×2 பருமனுள்ள தாயம் E ஐக் காண்க.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & b \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^T B = C$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & b \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad \boxed{05}$$

$$\begin{pmatrix} 0+4-a & 1+2b+0 \\ 0+0-2 & 3+0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4-a & 2b+1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad \boxed{10}$$

$$\therefore 4-a=2 \Rightarrow a=2 \quad \boxed{05}$$

$$2b+1=5 \Rightarrow b=2 \quad \boxed{05}$$

25

$$P = A^T B + \lambda D \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$= C + \lambda D$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \boxed{05}$$

$$P = \begin{pmatrix} \lambda + 2 & \lambda + 5 \\ \lambda - 2 & 2\lambda + 3 \end{pmatrix} \quad \boxed{05}$$

$$|P| = (\lambda + 2)(2\lambda + 3) - (\lambda - 2)(\lambda + 5) \quad \boxed{05}$$

$$= \lambda^2 + 4\lambda + 16$$

$$|P| = (\lambda + 2)^2 + 12 \quad \dots\dots\dots(2) \quad \boxed{05}$$

எல்லா $\lambda \in \mathbb{R}$ இற்கும் $|P| \neq 0$ $\boxed{05}$

$\therefore$ எல்லா λ இற்கும் P^{-1} உண்டு $\boxed{05}$

30

$\lambda = 1$ எனின் $Q \Rightarrow |P| = 21$

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P^{-1} = \frac{1}{|P|} \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \boxed{05}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{21} \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{21} & \frac{-6}{21} \\ \frac{1}{21} & \frac{3}{21} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{21} & \frac{-2}{7} \\ \frac{1}{21} & \frac{1}{7} \end{pmatrix} \quad \boxed{05}$$

10

$$EP = A^T B + 2D$$

$$= (A^T B + D) + D \quad \boxed{05}$$

$EP = P + D, \therefore D$ இல் $\lambda = 1$ ஐ இட

$$\Rightarrow (EP)P^{-1} = (P + D)P^{-1} \quad \boxed{05}$$

$$E(PP^{-1}) = PP^{-1} + DP^{-1}$$

$$EI = I + DP^{-1} \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{21} & \frac{-2}{7} \\ \frac{1}{21} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$


$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{5}{21} + \frac{1}{21} & \frac{-2}{7} + \frac{1}{7} \\ \frac{5}{21} + \frac{2}{21} & \frac{-2}{7} + \frac{2}{7} \end{pmatrix} \quad \boxed{05}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{-1}{7} \\ \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E = \begin{pmatrix} 1 + \frac{2}{7} & \frac{-1}{7} \\ \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow E = \begin{pmatrix} \frac{9}{7} & \frac{-1}{7} \\ \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \quad \boxed{05}$$

25

- b) Z எனும் சிக்கல் எண் $Z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$; $r > 0$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ எனக்கொள்வோம். P என்பது சிக்கல் எண் Z ஐ ஆகண் வரிப்படத்தில் வகைக்குறிக்கும் புள்ளியாகும். இது $(2,0)$ ஐ மையமாகவும், உற்பத்தி ஊடாகவும் செல்லும் வட்டத்தில் உள்ளது. Q என்பது $(Z-2)$ எனும் சிக்கல் எண்ணை வகைக்குறிக்கும் புள்ளியாகும். ஆகண் வரிப்படத்தில் Q ஐக் குறித்து, **இதிலிருந்து**
- $Z-2 = 2(\cos 2\theta + i \sin 2\theta)$ எனக்காட்டுக. இப்போது $\theta = \frac{\pi}{6}$ எனக்கொள்வோம். R ஆனது $2i$ எனும் சிக்கல் எண் வகைக்குறிக்கும் புள்ளியாகும். $\{(Z-2) + 2i\}$ எனும் சிக்கல் எண் ஆகண் வரிப்படத்தில் வகைக்குறிக்கும் புள்ளி S எனின், S இருக்கும் இடத்தை விளக்கி $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$ என்பதை உய்த்தறிக.



$$Z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow P(r, \theta)$$

$$(2 \cos \theta) \times 2 = r \Rightarrow r = 4 \cos \theta$$

$$|Z - 2| = OQ = 2$$

$$\therefore Z - 2 = 2(\cos 2\theta + i \sin 2\theta) \quad \boxed{05}$$

15

$$\theta = \frac{\pi}{6} \Rightarrow Z - 2 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \\ = 1 + \sqrt{3}i \quad \boxed{05}$$

$(Z - 2) + 2i = Z_0$ (என்க) என்பது OQ, OR ஐ அடுத்துள்ள பக்கங்களாக கொண்டு வரையப்படும் இணைகரம் ORSQ எனின் S இல் இருக்கும். $\boxed{05}$

$$Z_0 = (Z - 2) + 2i \\ = (1 + \sqrt{3}i) + 2i$$

$$Z_0 = 1 + (\sqrt{3} + 2)i \quad \boxed{05}$$

15

OR = OR $\Rightarrow \therefore$ OQSR ஒரு சாய்சதுரம்

$$\Delta OSN \text{ இல் } \tan \frac{\pi}{12} = \frac{\operatorname{Re}(Z_0)}{\operatorname{Im}(Z_0)} \quad \boxed{05}$$

$$= \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \tan \frac{\pi}{2} = 2 - \sqrt{3} \quad \boxed{05}$$

10

c) $(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = (4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) + i(3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta)$ எனக் காட்டுக.

இம்முடிவையும், த மோய்வரின் தேற்றத்தையும் பயன்படுத்தி,

i) $\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$ எனவும்

ii) $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$ எனவும் காட்டுக.

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos^3 \theta + 3 \cos^2 \theta (i \sin \theta) + 3 \cos \theta (i \sin \theta)^2 + (i \sin \theta)^3 \quad \boxed{05}$$

$$= \cos^3 \theta + 3i \sin \theta (1 - \sin^2 \theta) - 3 \cos \theta (1 - \cos^2 \theta) - i \sin^3 \theta \quad \boxed{05}$$

10

$$\Rightarrow (\cos \theta + i \sin \theta)^3 = (4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) + i(3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta)$$

$$\Rightarrow \cos 3\theta + i \sin 3\theta = (4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) + i(3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta), \therefore \text{ (த மோய்வரின் தேற்றப்படி)}$$

(மெய்) $\Rightarrow \cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$ $\boxed{05}$

(கற்பனை) $\Rightarrow \sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$ $\boxed{05}$

10

14)

a) $x \neq 1$ இற்கு $f(x) = \frac{6x^2 + 9x + 5}{(x-1)^3}$ எனக்கொள்வோம். $x \neq 1$ இற்கு $f(x)$ இன் பெறுதி $f'(x)$

ஆனது $f'(x) = \frac{-6(x+1)(x+4)}{(x-1)^4}$ இனால் தரப்படுகிறது எனக்காட்டுக.

இதிலிருந்து, $f(x)$ திடமாக அதிகரிக்கும், திடமாகக் குறையும் x இன் வீச்சுக்களைக் காண்க.

அணுகு கோடுகள், வெட்டுத்துண்டு, திரும்பல் புள்ளிகள் ஆகியவற்றைக் காட்டி $y = f(x)$ இன்

வரைபை பரும்படியாக வரைக.

$x \neq 1$ இற்கு $f(x)$ இன் இரண்டாம் பெறுதி $f''(x)$ ஆனது $f''(x) = \frac{6(x+7)(2x+3)}{(x-1)^5}$

எனத்தரப்படி, $y = f(x)$ இன் வரைபின் விபத்திப் புள்ளிகளின் x ஆள்கூறுகளைக் காண்க.

$$f(x) = \frac{x^2 + 9x + 5}{(x-1)^3}; x \neq 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{(x-1)^3(12x+9) - (6x^2 + 9x + 5) \cdot 3(x-1)^2 \cdot 1}{(x-1)^6}$$

15

$$= \frac{3(x-1)^2 [(x+1)(4x+3) - (6x^2 + 9x + 5)]}{(x-1)^6}$$

$$= \frac{3[-2x^2 - 10x - 8]}{(x-1)^4}$$

$$f'(x) = \frac{-6(x^2 + 5x + 4)}{(x-1)^4}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-6(x+1)(x+4)}{(x-1)^4}; x \neq 1$$

05

20

$x=1$ இல் $f'(x)$ வரையறுக்கப்படாது


05

$x=1$ நிலைக்குத்து அணுகுகோடாகும்.

நிலையான புள்ளிகளில் $f'(x) = 0$

$$\Rightarrow x = -1, -4$$

05



$f(x)$ திடமாக அதிகரிக்கும் வீச்சு $-4 < x < -1$

05

$f(x)$ திடமாக குறையும் வீச்சு $-\infty < x < -4$ or $-1 < x < 1$ or $1 < x < +\infty$

05

$$y = f(x)$$

$$y = \frac{6x^2 + 9x + 5}{(x-1)^3}$$

$$x = 0 \Rightarrow y = -5 \Rightarrow (0, -5) \quad \boxed{05}$$

$$y = 0 \Rightarrow 6x^2 + 9x + 5 = 0$$

$$\Delta = 81 - 4 \times 6 \times 5 < 0$$

$\therefore$ வரைபு x அச்சை வெட்டாது $\boxed{05}$

$$y = \frac{x^2 \left(6 + \frac{9}{x} + \frac{5}{x^2} \right)}{x^3 \left(1 - \frac{1}{x} \right)^3} = \frac{\left(6 + \frac{9}{x} + \frac{5}{x^2} \right)}{x \left(1 - \frac{1}{x} \right)^3}$$

$$x \rightarrow \pm\infty \Rightarrow y \rightarrow 0$$

$\therefore y = 0$ என்பது கிடை அணுக்கோடு. $\boxed{05}$


$$y = \frac{6x^2 + 9x + 5}{(x-1)^3}$$

நிலையான $x = -1, -4$

$$x = -1 \Rightarrow y = -\frac{1}{4} \Rightarrow (-1, -\frac{1}{4}) \rightarrow \text{உயர்வு} \quad \boxed{05}$$

$$x = -4 \Rightarrow y = -\frac{13}{25} \Rightarrow (-4, -\frac{13}{25}) \rightarrow \text{இழிவு} \quad \boxed{05}$$

$\boxed{65}$



$\boxed{10}$

$\boxed{05}$

$\boxed{15}$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f''(x)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 12 \frac{(x+7)(x+\frac{3}{2})}{(x-1)^5} = 0 \text{ எனின் } x = -7, -\frac{3}{2}$$

$$x = -7 - \delta \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} < 0$$

$\Rightarrow x = -7$ இல் விபத்தி

05

$$x = -7 + \delta \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} > 0$$

$$x = -\frac{3}{2} - \delta \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} > 0$$

$\Rightarrow x = -\frac{3}{2}$ இல் விபத்தி

05

$$x = -\frac{3}{2} + \delta \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} < 0$$

$\therefore$ விபத்திப்புள்ளிகள் $x = -7, -\frac{3}{2}$

10

b) அருகில் உள்ள உருவில் நிழற்றப்பட்ட பிரதேசம் ஆனது

$AB = y$ m, $BC = x$ m எனும் நீள, அகலங்களையும்,

மாறாச்சுற்றளவு $2p$ m ஐயும் கொண்ட செவ்வகத்தில்


இருந்து ஒவ்வொரு உச்சிகளையும் மையமாகவும் $\frac{x}{2}$ m ஐ

ஆரையாகவும் கொண்ட கால் வட்டங்கள் நீக்கிப் பெறப்பட்ட

புற்றரையைக் காட்டுகிறது. $0 < x < p$ இற்கு புற்றரையின் பரப்பளவு $\Delta(x)$ ஆனது

$$\Delta(x) = \left\{ px - \left(\frac{\pi + 4}{4} \right) x^2 \right\} m^2 \text{ இனால் தரப்படுகிறது எனக்காட்டுக.}$$

$x = \frac{2p}{\pi + 4}$ m இல் பரப்பு Δ உயர்வு எனக்காட்டி, அப்போது $x : y = 2 : (\pi + 2)$ எனவும் காட்டுக.



$$2(x + y) = 2p$$

$$\Rightarrow x + y = p$$

..... 05


பரப்பளவு $\Delta(x) =$ செவ்வகப்பரப்பு-4(கால்வட்டப்பரப்பு)

$$= xy - \pi \left(\frac{x}{2} \right)^2 \quad 10$$

$$\Delta(x) = xy - \frac{\pi x^2}{4}$$

$$= x(p - x) - \frac{\pi x^2}{4}$$

05



20

$$\Delta(x) = px - \frac{(\pi+4)}{4}x^2$$

x குறித்து வகையிட

$$\frac{d\Delta(x)}{dx} = p \times 1 - \frac{(\pi+4)}{4} \times 2x \quad \boxed{05}$$

$$= p - \frac{(\pi+4)}{4} 2x$$

$$\frac{d\Delta(x)}{dx} = -\frac{(\pi+4)}{2} \left[x - \frac{2p}{\pi+4} \right]$$

நிலையான புள்ளிகளில் $\frac{d\Delta(x)}{dx} = 0 \Rightarrow x = \frac{2p}{\pi+4} \quad \boxed{05}$

$$0 < x < \frac{2p}{\pi+4} \Rightarrow \frac{d\Delta(x)}{dx} > 0 \quad \boxed{05} \quad \Rightarrow x = \frac{2p}{\pi+4} \text{ இல் } \Delta \text{ உயர்வு}$$

$$\frac{2p}{\pi+4} < x < p \Rightarrow \frac{d\Delta(x)}{dx} < 0$$

$$x = \frac{2p}{\pi+4}$$

$$x(\pi+4) = 2(x+y); \text{ from (1)}$$

$$x(\pi+2) = 2y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{2}{\pi+2} \Rightarrow x:y = 2:(\pi+2)$$

$\boxed{05}$

$\boxed{20}$

15)

a) எல்லா $x \in \mathbb{R}$ இற்கு,

$$x^5 - 4x^4 - 27x^2 - 10x - 28 \equiv \lambda(x+1)(x^2+4)^2 + \mu(x^2+4)^2 + \gamma(x+1)^2(x^2+4) + \delta x(x+1)^2$$

ஆகுமாறு $\lambda, \mu, \gamma, \delta$ ஆகிய மாறிலிகளின் பெறுமானங்களைக் காண்க.

இதிலிருந்து $\frac{x^5 - 4x^4 - 27x^2 - 10x - 28}{(x+1)^2(x^2+4)^2}$ ஐப் பகுதிப் பின்னங்களில் எழுதி,

$$\int \frac{x^5 - 4x^4 - 27x^2 - 10x - 28}{(x+1)^2(x^2+4)^2} dx \text{ ஐக் காண்க.}$$

b) $I = \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \tan^{-1} \sqrt{2x^2-1} dx$ எனக்கொள்வோம். $I = \frac{\pi}{4} - \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{1}{\sqrt{2x^2-1}} dx$ எனக்காட்டி,

$\cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2x}} \right) = \theta$ எனும் பிரதியீட்டைப் பயன்படுத்தி, I இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

c) $\frac{d}{dx} \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x+4}) = \frac{1}{2\sqrt{(x+1)(x+4)}}$ எனக்காட்டுக. இங்கு $x > -1$.

இதிலிருந்து $\int \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x+4)}} dx$ ஐக் கண்டு,

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x+4)}} dx = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}\right)$ எனக்காட்டுக.

a ஒரு மாறிலியாக உள்ளபோது பெறு $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ ஐப்பயன்படுத்தி,

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x-2)(x-5)}} dx$ இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

(a) $x^5 - 4x^4 - 27x^2 - 10x - 28 \equiv \lambda(x+1)(x^2+4)^2 + \mu(x^2+4)^2 + \gamma(x+1)^2(x^2+4) + \delta x(x+1)^2$

$x = -1 \Rightarrow -1 - 4 - 27 + 10 - 28 = \lambda \times 0 + \mu \times 25 + \gamma \times 0 + \delta \times 0 - 50 = 25\mu \Rightarrow \mu = -2$ 05

$x^5 - 4x^4 - 27x^2 - 10x - 28 \equiv \lambda(x+1)(x^4 + 8x^2 + 16) + \mu(x^4 + 8x^2 + 16) + \gamma(x^2 + 2x + 1)(x^2 + 4) + \delta x(x^2 + 2x + 1)$

$[x^5] \Rightarrow 1 = \lambda$ 05

$[x^4] \Rightarrow -4 = \lambda + \mu + \gamma$

$-4 = 1 - 2 + \gamma \Rightarrow -3 = \gamma$ 05

$[x^3] \Rightarrow 0 = 8\lambda + 2\gamma + \delta \Rightarrow \delta = -2$ 05

$\therefore \lambda = 1, \mu = -2, \gamma = -3, \delta = -2$

$x^5 - 4x^4 - 27x^2 - 10x - 28 \equiv (x+1)(x^2+4)^2 - 2(x^2+4)^2 - 3(x+1)^2(x^2+4) - 2x(x+1)^2$

$\frac{x^5 - 4x^4 - 27x^2 - 10x - 28}{(x+1)^2(x^2+4)^2} \equiv \frac{(x+1)(x^2+4)^2 - 2(x^2+4)^2 - 3(x+1)^2(x^2+4) - 2x(x+1)^2}{(x+1)^2(x^2+4)^2}$

$\Rightarrow \frac{x^5 - 4x^4 - 27x^2 - 10x - 28}{(x+1)^2(x^2+4)^2} \equiv \frac{1}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2} - \frac{3}{x^2+4} - \frac{2x}{(x^2+4)^2}$ 05

$\int \frac{x^5 - 4x^4 - 27x^2 - 10x - 28}{(x+1)^2(x^2+4)^2} dx = \int \left\{ \frac{1}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2} - \frac{3}{x^2+4} - \frac{2x}{(x^2+4)^2} \right\} dx$

$= \int \frac{1}{x+1} dx - 2 \int (x+1)^{-2} dx - 3 \int \frac{1}{4+x^2} dx - \int (x^2+4)^{-2} (2x) dx$ 05

$= \ln|1+x| - 2 \frac{(x+1)^{-1}}{-1 \times 1} - \frac{3}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{(x^2+4)^{-1}}{-1} + C,$

05

05

05

05

இங்கு C எதேட்சை மாறிலி

$= \ln|1+x| + \frac{2}{x+1} - \frac{3}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{x^2+4} + C$

55

$$\begin{aligned}
 (b) \quad I &= \int_{1/\sqrt{2}}^1 \tan^{-1} \sqrt{2x^2 - 1} dx \\
 &= \int_{1/\sqrt{2}}^1 \left(\tan^{-1} \sqrt{2x^2 - 1} \right) dx \\
 &= \left[\left(\tan^{-1} \sqrt{2x^2 - 1} \right) \cdot x \right]_{1/\sqrt{2}}^1 - \int_{1/\sqrt{2}}^1 x \times \frac{1}{1 + \left(\sqrt{2x^2 - 1} \right)^2} \times \frac{1}{2} (2x^2 - 1)^{-1/2} \times 4x dx \\
 &= \tan^{-1} 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} 0 - \int_{1/\sqrt{2}}^1 \frac{2x^2}{2x^2 \sqrt{2x^2 - 1}} dx
 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\pi}{4} - \int_{1/\sqrt{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{2x^2 - 1}} dx \quad [05]$$

$$I = \frac{\pi}{4} - \int_0^{\pi/4} \frac{1}{\tan \theta} \frac{1}{\sqrt{2}} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\pi/4} \sec \theta d\theta \quad [05]$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}} [\ln(\sec \theta + \tan \theta)]_0^{\pi/4} \quad [05]$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}} [\ln(\sqrt{2} + 1) - \ln 1]$$

$$I = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2} + 1) \quad [05]$$

$$\text{பிரதியீடு } \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2x}} \right) = \theta$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2x}} = \cos \theta$$

$$\sqrt{2x} = \sec \theta$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} x dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$$

55

$$(c) \quad \frac{d}{dx} \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x+4}) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+4}} \times \left[\frac{1}{2} (x+1)^{-1/2} \cdot 1 + \frac{1}{2} (x+4)^{-1/2} \cdot 1 \right] dx \quad [10]$$

$$\frac{d}{dx} \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x+4}) = \frac{1}{2\sqrt{(x+1)(x+4)}} \quad [05]$$

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x+4}) \right\} dx = \int \frac{1}{2\sqrt{(x+1)(x+4)}} dx \quad [05]$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x+4)}} dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x+4)}} dx = 2 \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x+4}) + C, C \text{ எதேட்ச மாறிலி}$$

05

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x+4)}} dx = \left[2 \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x+4}) \right]_0^1$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x+2)(x+5)}} dx &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(1-x-2)(1-x-5)}} dx \\ \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x+4)}} dx &= 2 \ln \left(\frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3} \right) \dots \dots \dots (1) \quad \boxed{05} \\ \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x+2)(x+5)}} dx &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(1-x-2)(1-x-5)}} dx, \therefore \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(-x-1)(-x-4)}} dx \quad \boxed{10} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x-1)(x-4)}} dx \quad \boxed{05} \\ &= 2 \ln \left(\frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3} \right); \text{ from (1)} \\ &\quad \boxed{05} \end{aligned}$$

50

- 16) $P \equiv (\alpha, \beta)$ எனவும் l என்பது $ax + by + c = 0$ இனால் தரப்படும் நேர்கோடு எனவும் கொள்வோம், P இலிருந்து l இற்கு வரையும் செங்குத்து தூரம் $\frac{|a\alpha + b\beta + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ என நிறுவுக.
- கோடு l ஆனது $3x - 4y + 15a = 0$ எனக்கொள்வோம். இங்கு $a \neq 0$ ஆகும். $A \equiv (a, 2a)$, $B \equiv (2a, 4a)$ என்பன கோடு l இற்கு ஒரே பக்கத்தில் இருக்கின்றன எனக் காட்டுக.
- l ஐத் தொடுவனவும், முறையே A, B ஐ மையங்களாக கொண்டுள்ளனவாகவும் உள்ள S_1, S_2 எனும் வட்டங்களின் சமன்பாடுகளை a இன் சார்பில் காண்க.
- $a (\neq 0)$ இன் எல்லா பெறுமானங்களிற்கும் S_1, S_2 என்பன நிமிர் கோணத்தில் வெட்டும் எனக்காட்டுக.
- இப்போது $a = 2$ எனக் கொள்வோம். வட்டங்கள் S_1, S_2 என்பவற்றின் சமன்பாடுகளை எழுதுக.
- கோடு l இனதும் கோடு AB இனதும் வெட்டுப்புள்ளி C எனக் கொள்வோம். C இன் ஆள்கூறுகளைக் காண்க.
- S_1, S_2 ஆகியவற்றிற்கு C இனுடாக உள்ள மற்றைய தொடலியின் சமன்பாட்டை காண்க.


$$l : ax + by + c = 0 \Rightarrow l \quad \text{இன் படித்திறன்} = -\frac{a}{b}$$

$$\therefore m_{PN} = \frac{b}{a} \quad \boxed{05}$$

PN இல் $Q(x, y)$ என்க.

$$PN \Rightarrow y - \beta = \frac{b}{a}(x - \alpha) \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow \frac{x - \alpha}{a} = \frac{y - \beta}{b} = t \quad \text{ஏன்க} \quad \text{இங்கு} \quad t \in \mathbb{R} \quad \boxed{05}$$



$$x = \alpha + at, y = \beta + bt \quad \boxed{05}$$

$$Q \equiv (\alpha + at, \beta + bt) \equiv N \text{ என்க}$$

$$ax + by + c = 0 \text{ இல் இட}$$

$$a(\alpha + at) + b(\beta + bt) + c = 0 \quad \boxed{05}$$

$$t(a^2 + b^2) = -(a\alpha + b\beta + c)$$

$$t = \frac{(a\alpha + b\beta + c)}{a^2 + b^2} \quad \boxed{05}$$

$$P(\alpha, \beta), N \equiv (\alpha + at, \beta + bt)$$


$$PN = \sqrt{(\alpha + at - \alpha)^2 + (\beta + bt - \beta)^2} \quad \boxed{05}$$

$$= \sqrt{(a^2 + b^2)t^2}$$

$$= \sqrt{\frac{(a\alpha + b\beta + c)^2}{(a^2 + b^2)}}$$

$$\Rightarrow PN = \frac{|a\alpha + b\beta + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \boxed{05}$$

40



$$l: 3x - 4y + 15a = 0$$

$$A(a, 2a), B(2a, 4a) \text{ ஐ } 3x - 4y + 15a \text{ இல் இட}$$

$$(3 \times a - 4 \times 2a + 15a)(3 \times 2a - 4 \times 4a + 15a) \quad \boxed{05}$$

$$= 10a \times 5a$$

$$= 50a^2 > 0, \because a \neq 0$$

05

05

$\therefore$ கோடு l இற்கு A, B என்பன ஒரே பக்கத்தில் அமையும்

$$r_1 = \frac{|3 \times a - 4 \times 2a \times 15a|}{\sqrt{9+16}}, r_2 = \frac{|3 \times a - 4 \times 4a \times 15a|}{\sqrt{9+16}}$$

05

05

$$r_1 = \frac{10|a|}{5} = 2|a|. \quad 05$$

$$r_2 = \frac{5|a|}{5} = |a| \quad 05$$

$$S_1 \Rightarrow (x-a)^2 + (y-2a)^2 = (2|a|)^2, S_2 \Rightarrow (x-2a)^2 + (y-4a)^2 = |a|^2$$

$$\Rightarrow S_1 \equiv x^2 - y^2 - 2ax - 4ay + a^2 = 0, S_2 \equiv x^2 + y^2 - 4ax - 8ay + 19a^2 = 0$$

05

05

45

நிமிர் கோணத்தில் வெட்ட $2g_1g_2 + 2f_1f_2 = C_1 + C_2$ 05

$$g_1 = -a, f_1 = -2a.c_1 = a^2$$

$$g_2 = -2a, f_2 = -4a.c_2 = 19a^2$$

Consider $2g_1g_2 + 2f_1f_2 = 2 \times (-a) \times (-20) + 2 \times (-2a) \times (-4a)$

$$= 4a^2 + 16a^2$$

$$2g_1g_2 + 2f_1f_2 = 20a^2 \quad 05$$

Consider $C_1 + C_2 = a^2 + 19a^2$

$$= 20a^2 \quad 05$$

$\therefore$ எல்லா a இற்கு $2g_1g_2 + 2f_1f_2 = C_1 + C_2$

$\therefore$ எப்போதும் S_1, S_2 என்பன நிமிர்கோணத்தில் வெட்டும். 05

20

$a = 2$ எனின் $S_1 \Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$

$$S_2 \Rightarrow x^2 + y^2 - 8a - 16y + 76 = 0$$

05

$$a = 2 \Rightarrow A \equiv (2,4), B \equiv (4,8)$$

$$AB \Rightarrow y - 4 = \left(\frac{8-4}{4-2} \right) (x - 2) \quad 05$$

$$\Rightarrow 2x - y = 0 \Rightarrow y = 2x \quad 05$$

$$l: 3x - 4y + 30 = 0$$

$$AB \Rightarrow y = 2x \Rightarrow C \equiv (6,12) \quad 05$$

$C \equiv (6,12)$ இல் இருந்து S_1, S_2 என்பவற்றிற்கு வரையும் தொடலியின் படித்திறன் m என்க

$\therefore$ தொடலியின் சமன்பாடு,

$$y - 12 = m(x - 6) \quad \boxed{05}$$

$$mx - y + (12 - 6m) = 0$$

$$A \equiv (2,4), r_1 = 4$$

$$AM = r_1$$

$$\Rightarrow \frac{|m \times 2 - 4 + (12 - 6m)|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 4 \quad \boxed{05}$$

$$|8 - 4m| = 4\sqrt{m^2 + 1}$$

$$\Rightarrow |2 - m| = \sqrt{m^2 + 1}$$

$$\Rightarrow (2 - m)^2 = m^2 + 1$$

$$3 = 4m \Rightarrow m = \frac{3}{4} \quad \boxed{05}$$

இது தரப்பட்ட தொடலியின் படித்திறன்

$\therefore$ மற்றைய தொடலி y -அச்சிற்கு சமாந்தரமாகும்.

$\boxed{05}$

மற்றைய தொடலியின் சமன்பாடு $x=6$ $\boxed{05}$

$\boxed{20}$

17)

a) $\sin(A+B), \cos(A+B)$ என்பவற்றின் விரிவுகளை $\sin A, \cos A, \sin B, \cos B$ ஆகியவற்றில்

எழுதுக. இதிலிருந்து

i) $\sin 2\theta = 2\sin \theta \cos \theta$

ii) $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$

iii) $\sin 3\theta = 3\sin \theta - 4\sin^3 \theta$ என்பவற்றைக் காட்டுக.

$\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$ என்பதை உய்த்தறிக்க.

$\sin 3\theta, \cos 3\theta$ ஆகியவற்றின் முடிவுகளைப் பயன்படுத்தி $\sin 3x + \sin x + \cos 3x - \cos x = 0$ ஐத் தீர்க்க.

b) வழக்கமான குறிப்பீட்டில் முக்கோணி ABC இல் சைன் நெறி, கோசைன் நெறியைக் கூறுக.

முக்கோணி ABC இல் வழக்கமான குறிப்பீட்டுடன் $\cos(A-B) = \frac{61}{64}$ எனின்

$2\sin(A+B)\cos(A-B) = \sin 2A + \sin 2B$ எனும் முடிவையும், சைன் நெறியையும் பயன்படுத்தி

$a \cos A + b \cos B = \frac{61}{64}c$ எனக்காட்டுக.

இதிலிருந்து $a = 2, b = 3$ எனின் $c = 4$ எனக்காட்டுக.

c) $\sin^{-1}(e^{-x}\sqrt{e^{2x}-1}) + \cos^{-1}(e^{-x}) = \frac{\pi}{2}$ எனும் சமன்பாட்டை தீர்க்க.

a) $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$, $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

05

05

10

i. $\sin 2\theta = \sin(\theta + \theta)$

$$= \sin \theta \cos \theta + \cos \theta \sin \theta$$

05

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

05

ii. $\cos 2\theta = \cos(\theta + \theta)$

$$= \cos \theta \cos \theta - \sin \theta \sin \theta$$

05

$$= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$= -(1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta$$

05

$$\Rightarrow \cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

10

iii. $\sin 3\theta = \sin(\theta + 2\theta)$

$$= \sin \theta \cos 2\theta + \cos \theta \sin 2\theta$$

05

$$= \sin \theta (1 - 2 \sin^2 \theta) + \cos \theta \cdot 2 \sin \theta \cos \theta$$

05

$$= \sin \theta - 2 \sin^3 \theta + 2 \sin \theta (1 - \sin^2 \theta)$$

$$\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$$

05

15

$$\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - \theta \Rightarrow \sin 3\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 4 \sin^3\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

05

05

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} - 3\theta\right) = 3 \cos \theta - 4 \cos^3 \theta$$

$$\Rightarrow -\cos 3\theta = 3 \cos \theta - 4 \cos^3 \theta$$

05

$$\Rightarrow \cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

05

20

$$\sin 3x + \sin x + \cos 3x - \cos x = 0$$

$$\Rightarrow (3 \sin x - 4 \sin^3 x) + \sin x + (4 \cos^3 x - 3 \cos x) - \cos x = 0$$

05

$$4(\sin x - \sin^3 x + \cos^3 x - \cos x) = 0$$

$$\Rightarrow (\sin x - \cos x) - (\sin^3 x - \cos^3 x) = 0$$

$$(\sin x - \cos x) - (\sin x - \cos x)(\sin^2 x + \sin x \cos x + \cos^2 x) = 0$$

05

$$(\sin x - \cos x) - (\sin x - \cos x)\left(1 + \frac{1}{2} \sin 2x\right) = 0$$

$$(\sin x - \cos x) \left[1 - \left(1 + \frac{1}{2} \sin 2x\right) \right] = 0$$

$$\frac{1}{2} \sin 2x (\sin x - \cos x) = 0 \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow \sin 2x = 0 \text{ or } \sin x - \cos x = 0$$

$$\sin 2x = \sin 0$$

$$\sin x = \cos x$$

$$\tan x = 1;$$

$$\because \cos x \neq 0$$

$$2x = n\pi + (-1)^n \cdot 0 \quad \boxed{05}$$


$$\tan x = \tan \frac{\pi}{4} \quad \boxed{05}$$

$$x = n \frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$$

$$x = m\pi + \frac{\pi}{4}; m \in \mathbb{Z}$$

25

b)



$$\text{Sin-Rule} \quad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad \boxed{05}$$

$$\text{Cos-Rule} \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad \boxed{05}$$

10

$$\cos(A - B) = \frac{61}{64}$$

$$\Rightarrow 2 \sin(A + B) \cos(A - B) = \frac{61}{32} \sin(A + B) \quad \boxed{05}$$

$$\sin 2A + \sin 2B = \frac{61}{32} \sin C \quad \boxed{05}$$

$$\because A + B + C = \pi$$

$$\Rightarrow A + B = \pi - C$$

$$2 \sin A \cos A + 2 \sin B \cos B = \frac{61}{32} \sin C \quad \boxed{05}$$

$$2ka \cos A + 2kb \cos B = \frac{61}{64} \times kc \quad \boxed{05}$$

$$\therefore \text{Sin-Rule} \quad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{1}{k} \quad \text{என்க} \quad \boxed{05}$$

20

$$\Rightarrow a \cos A + b \cos B = \frac{61}{64} c$$

$$a = 2, b = 3 \quad \text{எனின்}$$

$$\Rightarrow a \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + b \frac{(a^2 + c^2 - b^2)}{2ac} = \frac{61}{64} c \quad \boxed{05} \quad \therefore \text{Cos-Rule}$$

$$\frac{2(9 + c^2 - 4)}{2 \times 3c} + \frac{3(4 + c^2 - 9)}{2 \times 2c} = \frac{61}{64} c \quad \boxed{05}$$

$$4(5 + c^2) + 9(c^2 - 5) = \frac{3 \times 61 c^2}{16}$$

$$\Rightarrow 64(5 + c^2) + 144(c^2 - 5) = 183c^2$$

$$\Rightarrow c^2 = 16$$

$$\Rightarrow c = 4; \therefore c > 0 \quad \boxed{05}$$

15

c) $\sin^{-1}(e^{-x} \sqrt{e^{2x} - 1}) = \alpha$ என்க. இங்கு $e^{-x} \sqrt{e^{2x} - 1} > 0$

05

$$\Rightarrow 0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$$

$$e^{-x} \sqrt{e^{2x} - 1} = \sin \alpha$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{\sqrt{e^{2x} - 1}}{e^x}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{e^x} = e^{-x}$$

$$\Rightarrow \alpha = \cos^{-1} e^x \quad \boxed{05}$$


$$\therefore \sin^{-1}(e^{-x} \sqrt{e^{2x} - 1}) + \cos^{-1}(e^x) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha + \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow 2\alpha = \frac{\pi}{2} \quad \boxed{05}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$$

20




மொறுட்டுவைப் பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீட தமிழ் மாணவர்கள்
நடாத்தும் க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான 13^{வது}

முன்னோடிப் பரீட்சை 2022

10(II) - இணைந்தகணிதம் II


விடைகள் (புள்ளியிடும் திட்டம்)



Prepared By
B.Raveendran B.Sc.

பகுதி A


1. உருவிற் காணப்படுகின்றவாறு முறையே $2m, m$ திணிவுள்ள A, B எனும் இரு துணிக்கைகள் ஒரு ஒப்பமான கிடை மேசை மீது வைக்கப்பட்டு ஒரே நேர்கோட்டில் ஆனால் எதிர்த் திசைகளில் இயங்கிக்கொண்டு நேரடியாக மோதுகின்றன. மோதுகைக்குச் சற்று முன்னர் A, B ஆகியவற்றின் வேகங்கள் முறையே $3u, 2u$



ஆகும். மோதுகையின் பின்னர் B யானது சுவரை நோக்கி $\frac{8u}{3}$ எனும் வேகத்துடன் இயங்குகின்றது எனின் துணிக்கைகளுக்கு இடையிலான மீளமைவுக் குணகத்தைக் காண்க. தொடரும் இயக்கத்தில் B யானது சுவருடன் மோதும் போது துணிக்கை மீது வழங்கப்படும் கணத்தாக்கு $\frac{14mu}{3}$ எனின் B யிற்கும் சுவருக்கும் இடையிலான மீளமைவுக் குணகம் $\frac{3}{4}$ எனக் காட்டுக.

தொகுதிக்கு $I = \Delta(mv)$

$$\rightarrow 0 = \left(m \cdot \frac{8u}{3} + 2mv \right) - (2m \cdot 3u - m \cdot 2u) \quad (5)$$




$$v = \frac{2u}{3} \quad (5)$$

நியூட்டனின் பரிசோதனை விதிப்படி

$$\frac{8u}{3} - \frac{2u}{3} = e(2u + 3u) \Rightarrow e = \frac{2}{5} \quad (5)$$

B யிற்கு $I = \Delta mv$

$$\leftarrow \frac{14}{3} mu = mv' - \left(-\frac{8mu}{3} \right) \Rightarrow v' = 2u \quad (5)$$




நியூட்டனின் பரிசோதனை விதிப்படி

$$v' = e' \cdot \frac{8u}{3} \Rightarrow 2u = e' \cdot \frac{8u}{3} \Rightarrow e' = \frac{3}{4} \quad (5)$$

25

2. படத்தில் காட்டியவாறு h உயரமான கூடைப்பந்தாட்ட வீரர் ஒருவர் தன்னிலிருந்து d தூரத்தில் H உயரத்திலுள்ள கூடையினுள் பந்து விழுமாறு கிடையுடன் $\theta = \pi/4$ சாய்வில் v கதியுடன் பந்து ஒன்றை எறிகின்றார். பந்தானது சரியாக கூடையினுள் விழுகின்றது எனின் $v^2 = \frac{gd^2}{d+h-H}$ எனக்காட்டுக. இதிலிருந்து $H < d+h$ எனக்காட்டுக.



$$s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$\rightarrow d = v \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) t \quad (5) \Rightarrow t = \frac{\sqrt{2} d}{v}$$

$$\uparrow H - h = v \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) t - \frac{1}{2} gt^2 \quad (5)$$

$$H - h = v \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2} d}{v} - \frac{1}{2} g \frac{2d^2}{v^2}$$

$$v^2 = \frac{gd^2}{d+h-H} \quad (5)$$


$$v^2 > 0, gd^2 > 0 \Rightarrow d+h-H > 0 \quad (5)$$

$$\therefore H < d+h$$

25

3. திணிவு m ஐ உடைய ஒரு துணிக்கை P ஓர் ஒப்பமான கிடைமேசை மீது வைக்கப்பட்டு A, B எனும் இரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட சிறிய ஒப்பமான கப்பிகளுக்கு மேலாகச் செல்லும் ஒரு இலேசான நீளா இழையினால் ஓர் இலேசான கப்பி C யுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முறையே $m, \lambda m (\lambda > 1)$ திணிவுள்ள

Q, R எனும் இரு துணிக்கைகள் கப்பி C யின் மேலாகச் செல்லும் ஓர் இலேசான நீட்டமுடியாத வேறோர் இழையினால் படத்தில் காட்டியவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. துணிக்கைகளும் இழைகளும் ஒரே நிலைக்குத்துத் தளத்தில் இருக்கின்றன. இழைகள் இறுக்கமாக இருக்க தொகுதி ஓய்விலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றது. Q, R இனை இணைக்கும் இழையில் உள்ள இழுவையைத் துணிவதற்குப் போதுமான சமன்பாடுகளை எழுதுக.



$$a_{P,E} = f \leftarrow$$

$$a_{Q,C} = F \uparrow \quad a_{R,C} = F \downarrow$$


$$F = ma \text{ இனைப் பிரயோகிக்க}$$

$$(P) \leftarrow T_1 = mf \quad (5)$$

$$(C) \downarrow 2T_2 - T_1 = 0 \quad (5)$$

$$(Q) \uparrow T_2 - mg = m(F - f) \quad (5)$$

$$(R) \downarrow \lambda mg - T_2 = \lambda m(F + f) \quad (5)$$



25

4. $M kg$ திணிவும் $P kW$ எனும் மாறா வலுவையும் உட்கூற்றும் கார் ஒன்று கிடையுடன் α சாய்வில் உள்ள பாதை ஒன்றில் λMg எனும் மாறாத்தடைவிசைக்கு எதிராக μg எனும் சீரான ஆர்முடுகலுடன் மேல்நோக்கிச் செல்லும் போது அதன் கதி v_1 எனவும் μg எனும் ஆர்முடுகலுடன் கீழ்நோக்கிச் செல்லும்போது அதன் கதி v_2 எனவும் தரப்படின் $\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda + \mu - \sin \alpha}{\lambda + \mu + \sin \alpha}$ எனக்காட்டுக.

மேல் நோக்கிய பிரயாணத்திற்கு

$$P = Fv \Rightarrow 1000P = F_1 v_1 \Rightarrow F_1 = \frac{1000P}{v_1} \quad (5)$$

$$\nearrow F = ma \Rightarrow \frac{1000P}{v_1} - \lambda Mg - Mg \sin \alpha = M \mu g \quad (5)$$

$$v_1 = \frac{1000P}{Mg(\mu + \lambda + \sin \alpha)}$$



கீழ் நோக்கிய பிரயாணத்திற்கு

$$P = Fv \Rightarrow F_2 = \frac{1000P}{v_2} \quad (5)$$

$$\searrow F = ma \Rightarrow \frac{1000P}{v_2} + Mg \sin \alpha - \lambda Mg = M \mu g \quad (5)$$


$$v_2 = \frac{1000P}{Mg(\lambda + \mu - \sin \alpha)}$$

$$\therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda + \mu - \sin \alpha}{\lambda + \mu + \sin \alpha} \quad (5)$$



25

5. O இனை மையமாகவும் R இனை ஆரையாகவும் உடைய ஒப்பமான அரைக்கோளம் ஒன்று அதன் தளமுகம் ஒரு கிடைத்தளம் மீது இருக்குமாறு நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. m திணிவுள்ள துணிக்கை P யானது R நீளமான ஒரு இலேசான நீட்டமுடியாத இழை ஒன்றின் ஒரு முனைக்கு இணைக்கப்பட்டு இழையின் மறுமுனை O இற்கு நிலைக்குத்தாக மேலே $2h$ உயரத்தில் உள்ள O' எனும் நிலைத்த புள்ளிக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. P யானது அரைக்கோள மேற்பரப்பின் மீது ஓர் கிடை வட்டப்பாதையில் ω எனும் கோண வேகத்துடன் உருவில் காட்டியாவாறு இயங்குகின்றது. துணிக்கையானது அரைக்கோள மேற்பரப்பை விட்டு வெளியேறும் தறுவாயில் உள்ளது எனின் $\omega = \sqrt{\frac{g}{h}}$ எனவும் இழையில் உள்ள



இழுவை $\frac{mgR}{h}$ எனவும் காட்டுக.

மேற்பரப்பை விட்டு வெளியேறும் தறுவாயில் இருப்பதால் $N = 0$ (5)

$F = ma$ இனைப் பிரயோகிக்க


$$\uparrow T \cos \theta = mg$$

$$T = \frac{mgR}{h} \quad (5)$$

$$\rightarrow T \sin \theta = m R \sin \theta \cdot \omega^2 \quad (5)$$

$$\frac{mgR}{h} \cdot \sin \theta = m R \sin \theta \cdot \omega^2$$

$$\omega^2 = \frac{g}{h} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{h}} \quad (5)$$



6. வழக்கமான குறிப்பீட்டில், ஓர் உற்பத்தி O வைக்குறித்து A, B, C எனும் மூன்று புள்ளிகளின் தானக்காவிகள் முறையே $3\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$, $6\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$, $\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ ஆகும். P ஆனது AB மீது $AB \perp CP$ ஆகுமாறு உள்ள புள்ளி எனின் P யின் தானக்காவியைக் கண்டு P ஆனது AB இனை 1:2 எனும் விகிதத்தில் பிரிக்கின்றது எனக் காட்டுக.

$$\overrightarrow{OP} = \alpha\mathbf{i} + \beta\mathbf{j} \text{ என்க.}$$

$$\overrightarrow{AP} = (\alpha\mathbf{i} + \beta\mathbf{j}) - (3\mathbf{i} + 6\mathbf{j}) = (\alpha - 3)\mathbf{i} + (\beta - 6)\mathbf{j}$$

$$\overrightarrow{AB} = (6\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) - (3\mathbf{i} + 6\mathbf{j}) = 3(\mathbf{i} - \mathbf{j})$$

$$\overrightarrow{CP} = (\alpha\mathbf{i} + \beta\mathbf{j}) - (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) = (\alpha - 1)\mathbf{i} + (\beta - 2)\mathbf{j} \quad (5)$$

$$AB \perp CP \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CP} = 0$$

$$3(\mathbf{i} - \mathbf{j}) \cdot ((\alpha - 1)\mathbf{i} + (\beta - 2)\mathbf{j}) = 0 \Rightarrow \alpha - \beta = -1 \quad \text{-----} \textcircled{1} \quad (5)$$

$$P \text{ யானது } AB \text{ மீது இருப்பதால் } \overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB}$$

$$(\alpha - 3)\mathbf{i} + (\beta - 6)\mathbf{j} = 3\lambda(\mathbf{i} - \mathbf{j}) \Rightarrow (\alpha - 3 - 3\lambda)\mathbf{i} + (\beta - 6 + 3\lambda)\mathbf{j} = 0 \quad (5)$$

$$\alpha - 3\lambda - 3 = 0 \quad \text{-----} \textcircled{2} \quad \beta + 3\lambda - 6 = 0 \quad \text{-----} \textcircled{3}$$


$$\textcircled{2} + \textcircled{3} \Rightarrow \alpha + \beta = 9 \quad \text{-----} \textcircled{4}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{4} \Rightarrow \alpha = 4, \beta = 5 \quad \therefore \overrightarrow{OP} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j} \quad (5)$$

$$\textcircled{2} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3} \quad \therefore AP:PB = 1:2 \quad (5)$$

25

7. AB ஆனது $4a$ நீளமும் $2w$ நிறையும் உடைய ஒரு சீரான கோலாகும். AB ஆனது A யில் பிணைக்கப்பட்டு முனை B யிற்கு w நிறை இணைக்கப்பட்டு கோலின் மீது உள்ள C எனும் புள்ளிக்கு இணைக்கப்பட்ட ஒரு இலேசான நீட்டமுடியாத இழையினால் படத்தில் காட்டியவாறு சமனிலையில் பேணப்படுகின்றது. சமனிலையில் AB கிடையாகவும் இழை கோலுடன் அமைக்கும் கோணம் α ஆகவும் உள்ளது. A யில் உள்ள மறுதாக்கத்தின் கிடை, நிலைக்குத்துக் கூறுகள் முறையே $2w, \frac{w}{3}$



எனத்தரப்படின் α இணைக் கண்டு இழையில் உள்ள இழுவை $T = \frac{10w}{3}$ எனவும் $AC = 3a$ எனவும் காட்டுக.

கோலின் சமனிலைக்கு

$$\uparrow T \sin \alpha + \frac{w}{3} - 2w - w = 0 \Rightarrow T \sin \alpha = \frac{8w}{3} \quad \text{-----} \textcircled{1} \quad \textcircled{5}$$


$$\rightarrow 2w - T \cos \alpha = 0 \Rightarrow T \cos \alpha = 2w \quad \text{-----} \textcircled{2} \quad \textcircled{5}$$

$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{1} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{4}{3} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) \\ \textcircled{2} \Rightarrow T \cdot \frac{4}{5} = \frac{8w}{3} \Rightarrow T = \frac{10w}{3} \end{array} \right\} \quad \textcircled{5}$$

$$A \curvearrowright 2a \times 2w - T \cdot AC \sin \alpha + 4aw = 0 \quad \textcircled{5}$$


$$8aw = \frac{10w}{3} \times AC \times \frac{4}{5}$$

$$AC = 3a \quad \textcircled{5}$$



25

8. $2a$ நீளமும் w நிறையும் உடைய ஒரு சீரான கோல் AB யின் ஒரு முனை A யிற்கு இலேசான வளையம் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வளையமானது கரடான கிடைக்கம்பி ஒன்றில் கோர்க்கப்பட்டு B யில் தாக்கும் ஒரு கிடை விசை P யினால் உருவில் காட்டியவாறு சமனிலையில் பேணப்படுகின்றது. கம்பிக்கும் வளையத்திற்கும் இடையிலான உராய்வுக் குணகம் μ ஆகும். சமனிலையில் கோல் நிலைக்குத்துடன் அமைக்கும் கோணம் θ எனின் $\theta \leq \tan^{-1}(2\mu)$ எனக் காட்டுக.



கோலின் சமனிலைக்கு

$$\left. \begin{array}{l} \uparrow R = w \\ \rightarrow F = P \end{array} \right\} \quad \textcircled{5}$$

$$A \curvearrowright w \times a \sin \theta - P \times 2a \cos \theta = 0 \quad \textcircled{5}$$


$$P = \frac{w}{2} \tan \theta = F$$

சமனிலைக்கு $\frac{F}{R} \leq \mu$

$$\frac{\frac{w}{2} \tan \theta}{w} \leq \mu \quad \textcircled{5}$$

$$\tan \theta \leq 2\mu \Rightarrow \theta \leq \tan^{-1}(2\mu)$$

$\textcircled{5}$



25

9. A, B ஆகியன ஒரு மாதிரிவெளி Ω இன் இரு நிகழ்வுகளெனக் கொள்வோம் வழக்கமான குறிப்பீட்டில் $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B|A) = \frac{3}{5}$, $P(A' \cap B) = \frac{2}{5}$ எனத்தரப்படின் $P(A \cap B)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$ ஆகியவற்றைக் காண்க. மேலும் A, B ஆகியன சாரா நிகழ்வுகள் எனக் காட்டுக. இங்கு A' ஆனது A இன் நிரப்பு நிகழ்வைக் குறிக்கின்றது.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3}{5}$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5} \quad (5)$$

$$P(A' \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{5}$$

$$P(B) = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \quad (5)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{11}{15} \quad (5)$$

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5} = P(A \cap B) \quad (5)$$

$$\therefore A, B \text{ சாரா நிகழ்ச்சிகள் ஆகும்.} \quad (5)$$

25

10. $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{10}\}$ என்பது 10 மாணவர்களுக்கு பரீட்சையில் வழங்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஆகும். $y_i = 10x_i + 5$ எனும் உருமாற்ற சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_{10}\}$ எனும் புள்ளிகள் பெறப்படுகின்றன. Y இனது இடை, நியம விலகல் என்பன முறையே 85, 5 எனக் கணிக்கப்பட்டது. மீள்பரிசோதனையில் $x_3 = 3$ ஆனது தவறுதலாக $x_3 = 8$ எனப் பதியப்பட்டது கண்டறியப்பட்டு திருத்தப்படுகின்றது. திருத்திய பின்னர் Y இனது இடையைக் கண்டு, நியமவிலகல் $5\sqrt{10}$ எனக் காட்டுக.

$$\text{பிழையான } y_i = 10 \times 8 + 5 = 85$$

$$\text{சரியான } y_i = 10 \times 3 + 5 = 35 \quad (5)$$

$$\text{சரியான } \sum_{i=1}^{10} y_i = 10 \times 85 - 85 + 35 = 800 \quad \therefore \bar{y} = \frac{800}{10} = 80 \quad (5)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{10} y_i^2}{10} - \bar{y}^2 = \sigma_y^2$$

$$\text{பிழையான } \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 10(5^2 + 85^2) = 72,500 \quad (5)$$

$$\text{திருத்திய } \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 72500 - 85^2 + 35^2 = 66,500 \quad (5)$$

$$\sigma_y^2 = \frac{66500}{10} - 80^2 = 250 \quad (5) \quad \therefore \sigma_y = 5\sqrt{10}$$

25



Inspire. Innovate. Engineer.

Undergraduate Degrees

**Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Civil Engineering**

**Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Information and
communication engineering**

**Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Electronics
and Power Systems**

**Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Telecommunication
Engineering**

**Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Electronics and
Engineering Management**

**Bachelor of Science (Hons) in
Engineering in Mechatronics Engineering**



www.sltc.ac.lk

0112 100 500



**RMIT University
RMIT Australia**

- Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering
- Bachelor of Engineering (Hons) Civil & Infrastructure
- Bachelor of Engineering (Hons) Automotive Engineering
- Bachelor of Engineering (Hons) Aerospace Engineering
- Bachelor of Engineering (Hons) Advanced Manufacturing & Mechatronics

RMIT Vietnam

- Bachelor of Engineering (Hons) Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Engineering (Hons) Robotics and Mechatronics Engineering

DEAKIN University, Australia

- Bachelor of Civil Engineering (Hons)
- Bachelor of Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Mechatronics Engineering



Lancaster University, UK

- Bachelor of Engineering (Hons)



University of Auckland, New Zealand

- Bachelor of Engineering (Hons)

Deakin University CRICOS Provider Code 001138 | RMIT CRICOS Provider Code 00122A

WE PROVIDE BEST QUALITY PRODUCTS

Northway

Family Mart

Save Money. Live Better.



Uppumadam Junction, K.K.S Road,

பகுதி B

11. (a) ஓர் நேர் வீதியில் உள்ள A, B எனும் இரு வீதி சமிக்ஞைகளுக்கு இடையிலான தூரம் d ஆகும். ஒரு காரானது A யிலிருந்து ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு f எனும் சீரான ஆற்றலுடன் இயங்கி v எனும் கதையை அடைந்து அக்கதியுடன் T நேரம் பயணித்து பின்னர் $2f$ எனும் அமர்முடுகலுடன் B யில் ஓய்வுக்கு வருகின்றது. காரின் இயக்கத்திற்கான வேக-நேர வரைபை வரைந்து $T = \frac{d}{v} - \frac{3v}{4f}$ எனக் காட்டுக.

காரானது A யிலிருந்து புறப்பட்டு $t_0 \left(< \frac{v}{f} \right)$ நேரத்தின் பின்னர் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று A யிலிருந்து

ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு a எனும் சீரான ஆற்றலுடன் B இனை நோக்கி பயணிக்கின்றது. மோட்டார் சைக்கிளானது C எனும் புள்ளியில் காரை கடக்கின்றது. $AC = D (< d)$ எனவும் மோட்டார் சைக்கிள் காரை கடக்கும்போது காரின் கதி v எனவும் தரப்பட்டுள்ளது. மோட்டார் சைக்கிளின் இயக்கத்திற்கான வேக-நேர

வரைபை அதே படத்தில் வரைந்து $t_0 = \frac{D}{v} + \frac{v}{2f} - \left(\frac{2D}{a} \right)^{\frac{1}{2}}$ எனக் காட்டுக.

காரின் இயக்கத்திற்கு


$$f = \frac{v}{t_1} \Rightarrow t_1 = \frac{v}{f} \quad (5)$$

$$2f = \frac{v}{t_2} \Rightarrow t_2 = \frac{v}{2f} \quad (5)$$

$$d = \frac{1}{2} \times t_1 \times v + vT + \frac{1}{2} \times v \times t_2 \quad (10)$$

$$d = \frac{v^2}{2f} + vT + \frac{v^2}{4f} \quad (5)$$

$$T = \frac{d}{v} - \frac{3v}{4f}$$



மோட்டார் சைக்கிளின் இயக்கத்திற்கு

$$a = \frac{v_1}{t_3} \Rightarrow v_1 = at_3 \quad (5)$$

$$D = \frac{1}{2} \times t_3 \times v_1$$


$$D = \frac{1}{2} \times t_3 \times at_3 \Rightarrow t_3 = \sqrt{\frac{2D}{a}} \quad (5)$$

$t = t_0 + t_3$ இல் கார் சென்ற தூரம் $= D$

$$\frac{1}{2} \times v \times t_1 + v(t_0 + t_3 - t_1) = D \quad (10)$$

$$\frac{v^2}{2f} + v \left(t_0 + \sqrt{\frac{2D}{a}} - \frac{v}{f} \right) = D \quad t_0 = \frac{D}{v} + \frac{v}{2f} - \left(\frac{2D}{a} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

(b) b அகலமானதும் சமாந்தரமான கரைகளையும் உடைய ஆறு ஒன்று சீரான வேகம் u உடன் படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு பாய்கின்றது. A, C என்பன ஆற்றின் ஒரு கரையிலும் B ஆனது ஆற்றின் மறுகரையிலும் $\overline{AB}$ ஆனது u உடன் கூர்ங்கோணம் α உம் $BC \perp AC$ ஆகுமாறும் உள்ளது. நீர் தொடர்பாக $\sqrt{2}u$ கதியுடன் நீந்தக்கூடிய சிறுவன் ஒருவன் A யிலிருந்து B யிற்கும் பின்னர் B யிலிருந்து C யிற்கும் நீந்துகிறான். இங்கு $|u| = u$ ஆகும். A யிலிருந்து B யிற்கும் பின்னர் B யிலிருந்து



C யிற்குமான இயக்கங்களுக்கான வேக முக்கோணிகளை ஒரே படத்தில் பரும்படியாக வரைக. இதிலிருந்து A யிலிருந்து B யிற்கு செல்லும்போது நீர் தொடர்பாக சிறுவனின் வேகம் $\overline{AB}$ உடன் θ கோணம் அமைக்கின்றது எனின் $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha$ எனக் காட்டுக. மேலும் B யிலிருந்து C யிற்குச் செல்லும்போது நீர் தொடர்பாக சிறுவனின் வேகம் $\overline{BC}$ உடன் $\pi/4$ கோணம் அமைக்கின்றது எனக் காட்டுக. சிறுவன் A யிலிருந்து B யிற்கு நீந்த எடுத்த நேரம் T_1 எனவும் B யிலிருந்து C யிற்கு நீந்த எடுத்த நேரம் T_2 எனவும் கொள்க. $T_2 = 2T_1 \sin 2\alpha$ எனின் $\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{2}} \cos \alpha$ எனக் காட்டுக. $\sin \theta, \cos \theta$ ஆகியவற்றுக்கான மேற்குறித்த கோவைகளைப் பயன்படுத்தி $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$ என உய்த்தறிக.

ஆறு $-R$ சிறுவன் $-B$ பூமி $-E$

$$A \rightarrow B : V_{B,E} = V_{B,R} + V_{R,E}$$

$$\nearrow w_1 = \sqrt{2}u + \rightarrow u \quad (5)$$

$$\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}$$

$$B \rightarrow C : V_{B,E} = V_{B,R} + V_{R,E}$$

$$\downarrow w_2 = \sqrt{2}u + \rightarrow u \quad (5)$$

$$\overrightarrow{PS} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QS}$$

ΔPQR இல் சைன் விதி $\Rightarrow$

$$\frac{\sqrt{2}u}{\sin \alpha} = \frac{u}{\sin \theta} \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha \quad (10)$$


$$\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \beta = \pi/4 \quad (5)$$

$\therefore B$ யிலிருந்து C யிற்குச் செல்லும்போது நீர் தொடர்பாக சிறுவனின் வேகம் $(\overrightarrow{QS}) \overline{BC}$ உடன்

$\pi/4$ கோணம் அமைக்கின்றது.

$$T_1 = \frac{AB}{w_1} = \frac{b/\sin \alpha}{u \cos \alpha + \sqrt{2}u \cos \theta} \quad (5)$$

$$T_2 = \frac{BC}{w_2} = \frac{b}{u} \quad (5)$$



$$T_2 = 2 \sin 2\alpha T_1$$

$$\frac{b}{u} = 2 \sin 2\alpha \frac{b}{\sin \alpha (u \cos \alpha + \sqrt{2}u \cos \theta)} \quad (5)$$

$$4 \cos \alpha = \cos \alpha + \sqrt{2} \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{2}} \cos \alpha \quad (5)$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha \right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \cos \alpha \right)^2 = 1 \quad (5)$$


$$\frac{1}{2}(1 - \cos^2 \alpha) + \frac{9}{2} \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right) \quad (5)$$

80

12. (a) உருவில் ABC ஆனது $\hat{BAC} = \frac{\pi}{2}$ ஆகவும் AB ஐக் கொண்டுள்ள

முகம் ஓர் ஒப்பமான கிடைமேசை மீதும் இருக்குமாறு வைக்கப்பட்ட திணிவு M ஐ உடைய ஓர் ஒப்பமான சீரான ஆப்பின் புவியீர்ப்பு மையத்தினூடான நிலைக்குத்து குறுக்குவெட்டாகும். DE ஆனது ஆப்பினுள் வெட்டப்பட்ட ஒப்பமான துவாரம் எனவும் DE, BC ஆகியன கிடையுடன் α கோணம் அமைக்கின்றன எனவும் தரப்பட்டுள்ளது. முறையே $m, 2m$ திணிவுள்ள P, Q என்னும் இரு துணிக்கைகள் முறையே DE, CB மீது வைக்கப்பட்டு D, C யில் பொருத்தப்பட்ட ஒப்பமான கப்பிகளுக்கு மேலாகச் செல்லும் ஒரு இலேசான நீட்டமுடியாத இழையின் முனைகளுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் $3m$ திணிவுள்ள துணிக்கை R ஆனது F இல் பொருத்தப்பட்ட ஒப்பமான கப்பியின் மேலாகச் செல்லும் ஒரு இலேசான நீட்டமுடியாத இழையினால் படத்தில் காட்டியவாறு ஆப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுதியானது உருவில் காட்டப்பட்டவாறு $AF = s$ ஆகுமாறு இருக்க பிடிக்கப்பட்டு ஒய்விலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றது. ஆப்பு மேசையின் விளிம்பு F இனை அடையும்வரை P துவாரத்தினுள் உள்ளது எனக் கொள்க. ஆப்பானது மேசையின் விளிம்பை அடையும்போது அதன் வேகம், அந்நேரத்தில் P துவாரத்தினுள் பயணித்த தூரம் ஆகியவற்றைத் துணிவதற்கு போதிய சமன்பாடுகளைப் பெறுக.



$$a_{W,E} = \leftarrow F$$

$$a_{P,W} = \nearrow f$$

$$a_{Q,W} = \nearrow f$$


$$a_{R,E} = \uparrow F$$

$$F = ma \text{ இனைப் பிரயோகிக்க}$$

$$(R) \downarrow 3mg - T_1 = 3mF \quad (10)$$

$$\text{தொகுதிக்கு}$$

$$\leftarrow T_1 = MF + m(F + f \cos \alpha) + 2m(F - f \cos \alpha) \quad (15)$$



$$(P) \quad T_2 - mg \sin \alpha = m(f + F \cos \alpha) \quad (10)$$

$$(Q) \quad 2mg \sin \alpha - T_2 = 2m(f - F \cos \alpha) \quad (10)$$

$$\text{ஆப்பிற்கு} \quad \leftarrow \quad v^2 = u^2 + 2as$$

$$v^2 = 2Fs \quad (5)$$

$$\leftarrow \quad v = u + at \quad \text{அல்லது} \quad \leftarrow \quad s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$v = Ft_1 \quad s = \frac{1}{2}Ft_1^2 \quad (5)$$


$$P \text{ யிற்கு ஆப்பு சார்பாக} \quad \leftarrow \quad s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$d = \frac{1}{2}ft_1^2 \quad (5)$$

70

(b) O ஐ மையமாகவும் a இனை ஆரையாகவும் உடைய ஒரு ஒப்பமான மெல்லிய குழாய் AB யும் O' ஐ மையமாகவும் a இனை ஆரையாகவும் உடைய ஒரு ஒப்பமான மெல்லிய குழாய் CD யும் படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு ஓர் நிலைக்குத்துத் தளத்தில் நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. BC ஆனது B, C யில் குழாய்களுக்கு தொடலியாக இருக்குமாறு உள்ள ஒரு கரடான தளமாகும். $\angle AOB = 5\pi/6$ எனவும்

$\angle C'O'D = \pi/3$ எனவும் தரப்பட்டுள்ளது. மேலும்




$BC = \sqrt{3}a$ ஆகும். திணிவு m ஐ உடைய ஒரு சிறிய ஒப்பமான மணி P யானது A யில் வைக்கப்பட்டு நிலைக்குத்தாக கீழ்நோக்கி u எனும் கதி வழங்கப்படும் போது அது குழாயின் வழியே இயங்கத் தொடங்குகின்றது. P ஆனது குழாய் AB யில் உள்ளபோது $\overline{OP}$ ஆனது $\overline{OA}$ உடன் θ ($0 \leq \theta \leq 5\pi/6$)

கோணம் அமைக்கும்போது அதன் கதி v ஆனது $v^2 = u^2 + 2ag \sin \theta$ இனால் தரப்படுகின்றது எனவும் அதன்

மீதுள்ள மறுதாக்கம் R ஆனது $R = \frac{m}{a}(u^2 + 3ag \sin \theta)$ இனால் தரப்படுகின்றது எனவும் காட்டுக.

தொடரும் இயக்கத்தில் மணியானது குழாய் AB யிலிருந்து B யில் வெளியேறி பின் கரடான தளம் BC மீது இயங்குகின்றது. துணிக்கை BC வழியே பயணிக்கும் போது அதன் மீது பிரயோகிக்கப்படும் உராய்வு விசையின் பருமன் $\frac{mg}{2\sqrt{3}}$ எனத்தரப்பட்டுள்ளது. மணி P யானது குழாய் CD யினுள் C யில் புகுந்து D யினை

அடைகின்றது எனின் $u^2 \geq 4ag$ எனக் காட்டுக. மேலும் மணி P யானது D யிலிருந்து வெளியேறி புவியீர்ப்பின்கீழ் இயங்கி தரையை கிடையுடன் $\pi/4$ சாய்வில் அடிக்கின்றது எனின் $u = 3\sqrt{ag}$ எனக் காட்டுக.



சக்திக்காப்புத் தத்துவத்தின்படி

$$\frac{1}{2}mv^2 - mga \sin \theta = \frac{1}{2}mu^2 + 0 \quad (10) \Rightarrow v^2 = u^2 + 2ag \sin \theta \quad (5)$$


$$\nearrow F = ma$$

$$R - mg \sin \theta = \frac{mv^2}{a} \quad (5)$$

$$R = mg \sin \theta + \frac{m}{a}(u^2 + 2ag \sin \theta)$$

$$= \frac{m}{a}(u^2 + 3ag \sin \theta) \quad (5)$$

$$\theta = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow w_1^2 = u^2 + 2ag \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) = u^2 + ag \quad (5)$$




BC வழியே $\nearrow F = ma$

$$-\frac{mg}{2\sqrt{3}} - mg \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) = mf \quad (5)$$

$$f = -\frac{2\sqrt{3}g}{3} \quad (5)$$

$$\nearrow v^2 = u^2 + 2as$$

$$w_2^2 = (u^2 + ag) + 2 \left(-\frac{2\sqrt{3}g}{3} \right) \sqrt{3}a = u^2 - 3ag \quad (5)$$



சக்திக்காப்புத் தத்துவத்தின்படி

$$\frac{1}{2}mw_2^2 + mga \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}mw_3^2 + mga \quad (10)$$

$$\Rightarrow w_3^2 = w_2^2 - ag$$

$$w_3^2 = u^2 - 4ag \quad (5)$$

$\therefore$ துணிக்கை D இனை அடையுமெனின்

$$w_3^2 \geq 0$$

$$u^2 - 4ag \geq 0 \quad (5)$$

$$u^2 \geq 4ag$$

$$\text{தரையிலிருந்து D யின் உயரம்} = \left(a - a \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right) + \sqrt{3}a \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) + \left(a - a \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) \right) = \frac{5a}{2}$$


$$\downarrow v^2 = u^2 + 2ag$$

$$v_1^2 = 0 + 2g \left(\frac{5a}{2} \right) = 5ag \quad (5)$$

$$\tan \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{v_1}{w_3} \Rightarrow 5ag = u^2 - 4ag \quad (5)$$


$$u^2 = 9ag$$

$$u = 3\sqrt{ag} \quad (5)$$



-
- Diagram showing a vertical rod of length $10a$ pivoted at the top. A mass is attached at a distance $\frac{3a}{2}$ from the pivot. A force A is applied at the top of the mass, and a force B is applied at the bottom of the mass. The distance between the forces is $\sqrt{2ag}$.

கதி $\sqrt{ag}$ எனக் காட்டுக. தொடரும் இயக்கத்தில் $OR = y$ எனின் y ஆனது $y'' + \frac{g}{8a}(y - 12a) = 0$ எனும் சமன்பாட்டைத் திருப்தி செய்யும் எனக்காட்டி இவ் எளிய இசை இயக்கத்தின் அலைவு மையத்தையும் வீச்சத்தையும் காண்க.



$$T_1 = \frac{3mg \times a}{4a} = \frac{3mg}{4} \quad (5)$$

$$T_2 = \frac{\lambda mg \times a}{4a} = \frac{\lambda mg}{4} \quad (5)$$

P யின் சமனிலைக்கு

$$T_1 + T_2 = 2mg \quad (5)$$


$$\frac{3mg}{4} + \frac{\lambda mg}{4} = 2mg$$

$\lambda = 5 \quad \textcircled{5}$

② $\downarrow v^2 = u^2 + 2as$

$$v^2 = 2ag + 2 \times g \times \frac{7a}{2} \quad (5)$$


$$=9ag \Rightarrow v=3\sqrt{ag} \quad (5)$$



P, Q இற்கு $\downarrow I = \Delta mv$

$$0 = 6mw - (4m \times 3\sqrt{ag} + 0) \quad (5)$$

$$w = 2\sqrt{ag} \quad (5)$$



R இற்கு $\uparrow F = ma$

$$T_1 + T_2 - 6mg = -6m\ddot{x} \quad (5)$$

$$\frac{3mg}{4a}(x-4a) + \frac{5mg}{4a}(x-4a) - 6mg = -6m\ddot{x} \quad (10)$$

$$\ddot{x} + \frac{g}{3a}(x-7a) = 0 \quad (5)$$

$$X = x - 7a \Rightarrow \dot{X} = \dot{x}, \ddot{X} = \ddot{x} \quad (5)$$

$$\ddot{X} + \frac{g}{3a}X = 0$$

$$\ddot{X} + \omega^2 X = 0 \quad \text{இங்கு } \omega^2 = \frac{g}{3a} \text{ ஆகும்.} \quad (5)$$

அலைவு மையம் $X = 0$ இனால் தரப்படும்

$$\Rightarrow x = 7a \quad (5)$$


$$\dot{X}^2 = \omega^2 (A^2 - X^2)$$

$$x = 5a \quad \text{இல் } \dot{x} = 2\sqrt{ag}$$

$$X = 5a - 7a = -2a$$

$$4ag = \frac{g}{3a}(A^2 - (-2a)^2) \quad (5)$$

$$A^2 = 16a^2 \Rightarrow A = 4a \quad (5)$$




$$\cos \theta_1 = \frac{1}{2} \quad \cos \theta_2 = \frac{3}{4} \quad (5)$$

$$\beta = \pi - \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) - \cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$= \frac{2\pi}{3} - \cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \quad (5)$$

$$t = \frac{\beta}{\omega} = \sqrt{\frac{3a}{g}} \left(\frac{2\pi}{3} - \cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \right) \quad (5)$$



துணிக்கை தரையை அடிக்கும்போது வேகம்


$$x = 10a \text{ ஆக } X = -3a$$

$$\dot{X}^2 = \frac{g}{3a}(16a^2 - 9a^2) \quad (5)$$

$$\dot{X}^2 = \frac{7ag}{3} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{7ag}{3}} \quad (5)$$

மோதிய பின் R இன் வேகம் $v_2 = ev_1$

$$v_2 = \sqrt{\frac{3}{7}} \sqrt{\frac{7ag}{3}} = \sqrt{ag} \quad (5)$$



$$(R) \uparrow F = ma$$

$$T - 6mg = -6m\ddot{y} \quad (5)$$

$$\frac{3mg}{4a}(y - 4a) - 6mg = -6m\ddot{y} \quad (5)$$

$$\ddot{y} + \frac{g}{8a}(y - 12a) = 0 \quad (5)$$

$$Y = y - 12a \Rightarrow \dot{Y} = \dot{y}, \quad \ddot{Y} = \ddot{y}$$

$$\ddot{Y} + \omega_1^2 Y = 0$$

$$\omega_1^2 = \frac{g}{8a} \quad (5)$$

$Y = 0$ இல் அலைவு மையம் பெறப்படும்

$$\Rightarrow y = 12a \quad (5)$$

$$\dot{Y}^2 = \omega^2 (A_1^2 - Y^2)$$

$$y = 10a \text{ இல் } \dot{y}^2 = ag = \dot{Y}^2$$

$$Y = 10a - 12a = -2a$$

$$ag = \frac{g}{8a} (A_1^2 - 4a^2) \quad (5)$$

$$A_1^2 = 12a^2$$

$$A_1 = 2\sqrt{3}a \quad (5)$$

14. (a) $OACB$ ஆனது $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ ஆகுமாறுள்ள ஒரு இணைகரம் ஆகும். D ஆனது OA இன் நடுப்புள்ளியும் E ஆனது OB மீது $\overrightarrow{OE} = k\overrightarrow{OB}$ ஆகுமாறும் உள்ள புள்ளிகள் ஆகும். $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{DE}$ ஆகியவற்றை $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ஆகியவற்றின் சார்பில் கண்டு $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{DE} = -\frac{1}{2}|\mathbf{a}|^2 + \left(k - \frac{1}{2}\right)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + k|\mathbf{b}|^2$ எனக் காட்டுக.

$\angle AOB = \frac{\pi}{3}$ எனவும் $k = \frac{1}{5}$ ஆகவும் உள்ள போது $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{DE}$ ஆகியன ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை எனின் $|\mathbf{b}| = 2|\mathbf{a}|$ எனக் காட்டுக.

OC, DE ஆகியன இடைவெட்டும் புள்ளி F ஆகும். $\overrightarrow{OF} = \lambda\overrightarrow{OC}$ எனவும் $\overrightarrow{FE} = \mu\overrightarrow{DE}$ எனவும் கொள்க. முக்கோணி OFE இல் காவிக் கூட்டலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்

$$\left(\lambda - \frac{\mu}{2}\right)\mathbf{a} + \left(\lambda + \frac{\mu}{5} - \frac{1}{5}\right)\mathbf{b} = \mathbf{0} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

இதிலிருந்து λ, μ இன் பெறுமானங்களைக் கண்டு F ஆனது OC இனை பிரிக்கும் விகிதத்தைக் காண்க.

$$\overrightarrow{OA} = \mathbf{a} \quad \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$$

$$\overrightarrow{OE} = k\overrightarrow{OB} = k\mathbf{b} \quad 0 < k < 1$$

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \mathbf{a} + \mathbf{b} \quad (5)$$

$$\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\mathbf{a}$$

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OE} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + k\mathbf{b} \quad (5)$$

$$\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{DE} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \left(-\frac{1}{2}\mathbf{a} + k\mathbf{b}\right) \quad (5)$$

$$= -\frac{1}{2}\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + k \cdot \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + k\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} \quad (5)$$

$$= -\frac{1}{2}|\mathbf{a}|^2 + \left(k - \frac{1}{2}\right)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + k|\mathbf{b}|^2 \quad (5)$$

$$\angle AOB = \frac{\pi}{3}, k = \frac{1}{5}, \overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{DE} \Rightarrow \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{DE} = 0$$

$$-\frac{1}{2}|\mathbf{a}|^2 + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2}\right)|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{5}|\mathbf{b}|^2 = 0 \quad (5)$$


$$4|\mathbf{b}|^2 - 3|\mathbf{a}||\mathbf{b}| - 10|\mathbf{a}|^2 = 0$$

$$(|\mathbf{b}| - 2|\mathbf{a}|)(4|\mathbf{b}| + 5|\mathbf{a}|) = 0 \quad (5)$$

$$|\mathbf{b}| = 2|\mathbf{a}| \quad (\because 4|\mathbf{b}| + 5|\mathbf{a}| \neq 0) \quad (5)$$

$$\overrightarrow{OF} = \lambda\overrightarrow{OC} = \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b})$$

$$\overrightarrow{FE} = \mu\overrightarrow{DE} = \mu\left(-\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{5}\mathbf{b}\right)$$



$$\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{FE}$$

$$\frac{1}{5}\mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mu\left(-\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{5}\mathbf{b}\right) \quad (10)$$

$$\left(\lambda - \frac{\mu}{2}\right)\mathbf{a} + \left(\lambda + \frac{\mu}{5} - \frac{1}{5}\right)\mathbf{b} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{a} \nparallel \mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$$


$$\therefore \lambda - \frac{\mu}{2} = 0 \quad \lambda + \frac{\mu}{5} - \frac{1}{5} = 0$$

$$\lambda = \frac{1}{7} \quad (5) \quad \mu = \frac{2}{7} \quad (5)$$

$$\therefore OF : FC = 1 : 6 \quad (5)$$


65

(b) $ABCDEF$ ஆனது ஒரு பக்க நீளம் a ஆகவுள்ள ஓர் ஒழுங்கான அறுகோணி ஆகும். $2P, 4P, \alpha P, P, 3P, P$ என்னும் பருமனுடைய விசைகள் முறையே $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{ED}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{FA}$ வழியே தாக்குகின்றன. இவ் விசைத்தொகுதியின் விளையுள் $\overrightarrow{AD}$ இற்கு சமாந்தரமாக தாக்குகின்றது எனின் α இணைக் கண்டு தொகுதியின் விளையுள் R இன் பருமனைக் காண்க. இவ்விளையுள் விசையினது தாக்கக்கோடு நீட்டப்பட்ட AB ஐ சந்திக்கும் புள்ளிக்கு A இலிருந்து உள்ள தூரத்தைக் காண்க. இவ் விசைத்தொகுதி A இனூடாகத் தாக்கும் R பருமனுடைய ஒரு தனி விசையுடன் பருமன் G உடைய ஓர் இணைக்கு சமவலுவானது எனின் G இன் பருமன், போக்கு ஆகியவற்றை காண்க. $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{FB}$ வழியே முறையே $\beta P, \gamma P$ பருமனுள்ள விசைகளைச் சேர்க்கும்போது தொகுதியானது ஓர் இணைக்கு ஒடுங்குகின்றது எனின் β, γ ஆகியவற்றையும் அவ் இணையின் பருமன், போக்கு என்பவற்றையும் காண்க.



$$\rightarrow X = 2P + 4P \cos 60 - \alpha P \cos 60 + P - 3P \cos 60 - P \cos 60 = \left(3 - \frac{\alpha}{2}\right)P \quad (10)$$

$$\uparrow Y = 4P \sin 60 + \alpha P \sin 60 - 3P \sin 60 + P \sin 60 = \left(1 + \frac{\alpha}{2}\right)\sqrt{3}P \quad (10)$$



வினையுள் $\overrightarrow{AD}$ இற்கு சமாந்தரம்

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

$$\tan 60^\circ = \frac{Y}{X} \quad (5)$$

$$\sqrt{3} = \frac{(1+\alpha/2)\sqrt{3}}{(3-\alpha/2)} \Rightarrow \alpha = 2 \quad (5)$$

$$X = 2P \quad Y = 2\sqrt{3}P$$

$$R = \sqrt{(2P)^2 + (2\sqrt{3}P)^2} = 4P \quad (5)$$

A பற்றிய தொகுதியின் திருப்பம் = A பற்றிய வினையுளின் திருப்பம்

$$\curvearrowleft A) 4P \times a \sin 60^\circ + 2P \cdot 2a \cos 30^\circ - P \cdot 2a \cos 30^\circ + 3P \times a \sin 60^\circ = R \cdot AM \cos 30^\circ \quad (10)$$


$$9aP \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4P \times AM \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$AM = \frac{9a}{4} \quad (5)$$

$$G = 4P \times AM \sin 60^\circ$$

$$= 4P \times \frac{9a}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{2} aP \quad (5)$$

ABCD போக்கு (5)



$$\uparrow - \gamma P \sin 30^\circ - \beta P \sin 30^\circ + 4P \sin 60^\circ = 0 \quad (5)$$

$$\beta + \gamma = 4\sqrt{3} \quad \text{-----} \textcircled{1}$$


$$\rightarrow - \beta P \cos 30^\circ + \gamma P \cos 30^\circ + 4P \cos 60^\circ = 0 \quad (5)$$

$$\sqrt{3}(\beta - \alpha) = 4 \quad \text{-----} \textcircled{2}$$


$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \Rightarrow \beta = \frac{8}{\sqrt{3}} \quad \gamma = \frac{4}{\sqrt{3}} \quad (5)$$

$$\curvearrowleft A) H = 4P \times \frac{9a}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{4}{\sqrt{3}} P \times a \sin 30^\circ$$

$$= \frac{23aP}{2\sqrt{3}} \quad (5) \quad ABCD \text{ போக்கு } (5)$$




15. (a) ஒவ்வொன்றும் நீளம் $2a$ ஐ உடைய AB, BC, CD எனும் மூன்று சீரான கோல்கள் முனைகள் B, C யில் ஒப்பமாக மூட்டப்பட்டுள்ளன. AB, BC, CD ஆகிய கோல்களின் நிறைகள் முறையே $kw, w, 3w$ ஆகும். முனை A ஒரு கிடை நிலத்தின் மீதுள்ள ஒரு நிலைத்த புள்ளியில் ஒப்பமாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுதியானது BC கிடையாகவும் $\angle DAB = \angle ADC = 60^\circ$ ஆகவும் கோல் CD இன் முனைப் புள்ளி D ஓர் கரடான கிடைத்தரையின்மீது இருக்குமாறும் உள்ளது. மேலும் படத்தில் காட்டியவாறு கோல்கள் இருக்கும் அதே நிலைக்குத்துத் தளத்தில் B யில் கிடையுடன் 60° சாய்வில் $\frac{w}{2\sqrt{3}}$ பருமனுடைய விசை



பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. கோல் BC இனால் CD மீது உருற்றப்படும் மறுதாக்கத்தின் கிடை, நிலைக்குத்துக் கூறுகளைக் கண்டு $k = 2$ எனக் காட்டுக.

D யில் தரையினால் கோல் CD இற்கு வழங்கப்படும் செவ்வன் மறுதாக்கம் $\frac{7w}{2}$ எனக்காட்டி கோலுக்கும் தரைக்கும் இடையிலான உராய்வு விசையைக் காண்க. மேலும் கோல் CD யிற்கும் தரைக்கும் இடையிலான உராய்வுக் குணகம் μ எனத்தரப்படின் தொகுதி சமனிலையில் இருக்கும்போது $\mu \geq \frac{4\sqrt{3}}{21}$ எனக்காட்டுக.



கோல் BC

$$\sum \tau_B = 0 \Rightarrow w \times a - Y \times 2a = 0 \quad (5) \Rightarrow Y = \frac{w}{2} \quad (5)$$

கோல் DC

$$\sum \tau_D = 0 \Rightarrow 3wa \times \cos 60^\circ + Y \times 2a \cos 60^\circ - X \times 2a \sin 60^\circ = 0 \quad (10) \Rightarrow X = \frac{2w}{\sqrt{3}} \quad (5)$$

கோல் AB, BC

$$\sum \tau_A = 0 \Rightarrow kw \times a \cos 60^\circ + \frac{w}{2\sqrt{3}} \times 2a \cos 30^\circ + w \times 2a - X \times 2a \sin 60^\circ - Y \times 3a = 0 \quad (15)$$

$$k = 2 \quad (5)$$



கோல் CD

$$\rightarrow X - F = 0 \Rightarrow F = \frac{2w}{\sqrt{3}} \quad (5)$$


$$\uparrow R - 3W - Y = 0 \Rightarrow R = \frac{7w}{2} \quad (5)$$

$$\text{சமனிலைக்கு } \frac{F}{R} \leq \mu \quad (5) \Rightarrow \mu \geq \frac{\frac{2w}{\sqrt{3}}}{\frac{7w}{2}} \quad (5) \Rightarrow \mu \geq \frac{4\sqrt{3}}{21}$$

(b) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள சட்டப்படல் அவற்றின் முனைகளில் ஒப்பமாக மூட்டப்பட்ட AB, BC, CD, DE, BE, BD எனும் ஆறு சம நீளமுள்ள இலேசான கோல்களைக் கொண்டுள்ளது. $3w, w$ பருமனுடைய விசைகள் முறையே C, D யில் தாக்கும் அதேவேளை சட்டப்படல் A யில் ஒரு நிலைத்த புள்ளியில் ஒப்பமாகப் பிணைக்கப்பட்டு E யில் கிடையுடன் 30° சாய்வில் தாக்கும் விசை P , B யில் நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி தாக்கும் விசை Q என்பவற்றால் AB, BC, DE ஆகிய கோல்கள் கிடையாக இருக்குமாறு நாப்பத்தில் வைக்கப்படுகின்றது. போவின் குறிப்பிட்டப் பயன்படுத்தி C, D, E, B ஆகிய மூட்டுகளுக்கு ஒரு தகைப்பு வரிப்படத்தை வரைக. இதிலிருந்து



தகைப்பு வரிப்படம்



P ஆனது cd இனால் தப்பும் $\Rightarrow P = 7w$ (5)

Q ஆனது ab இனால் தப்பும் $\Rightarrow Q = \frac{w}{2}$ (5)

சமச்சீரின்படி புவியீர்ப்பு மையம் y அச்சு மீது இருக்கும். (5)

$$m = \int_{\alpha}^{\pi/2} (2\pi R \sin \theta) R d\theta \sigma \quad (5)$$

$$= 2\pi R^2 \sigma \int_{\alpha}^{\pi/2} \sin \theta d\theta$$

$$= 2\pi R^2 \sigma [-\cos \theta]_{\alpha}^{\pi/2} \quad (5)$$

$$= 2\pi R^2 \sigma \cos \alpha = 2\pi R H \sigma$$

$$\bar{y} = \frac{\int_{\alpha}^{\pi/2} (2\pi R \sin \theta) R \sigma R \cos \theta d\theta}{2\pi R H \sigma} \quad (5)$$


$$= \frac{R^2}{H} \int_{\alpha}^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{R^2}{2H} \int_{\alpha}^{\pi/2} \sin 2\theta d\theta$$

$$= \frac{R^2}{2H} \frac{[-\cos 2\theta]_{\alpha}^{\pi/2}}{2} \quad (5)$$

$$= \frac{R^2}{4H} [1 + \cos 2\alpha]$$

$$= \frac{R^2}{4H} [2 \cos^2 \alpha] = \frac{R^2}{4H} 2 \left(\frac{H}{R} \right)^2 = \frac{H}{2} \quad (5)$$




சமச்சீரின்படி திணிவு மையம் x -அச்சில் கிடக்கும் (5)


$$\bar{x} = \frac{\int_0^l x \cos \theta \cdot 2\pi \sigma x \sin \theta dx}{\int_0^l 2\pi \sigma x \sin \theta dx} \quad (5)$$






$$= \frac{\cos \theta \int_0^l x^2 dx}{\int_0^l x dx} = \frac{\cos \theta \left(\frac{x^3}{3} \right)_0^l}{\left(\frac{x^2}{2} \right)_0^l} \quad (5)$$

$$= \frac{2l \cos \theta}{3} = \frac{2h}{3}$$

$$\text{அடியிலிருந்தான தூரம்} = h - \frac{2h}{3} = \frac{h}{3} \quad (5)$$





பொருள்	திணிவு	O' இலிருந்து தூரம்
	$7\pi a^2\sigma$ (5)	0 (5)
	$2 \times \pi \times 4a \times 3a \times \sigma$ $= 24\pi a^2\sigma$ (5)	$\frac{3a}{2}$ (5)
	$\pi \times 4a \times \frac{20a}{3} \times \sigma$ $= \frac{80}{3}\pi a^2\sigma$ (5)	$3a + \frac{16a}{9} = \frac{43a}{9}$ (5)
	$\pi \times a \times \frac{5a}{3} \times \sigma$ $= \frac{5}{3}\pi a^2\sigma$ (5)	$7a + \frac{4a}{9} = \frac{67a}{9}$ (5)
	$2\pi \times a \times \frac{a}{2} \times 4\sigma$ $= 4\pi a^2\sigma$ (5)	$7a + \frac{a}{4} = \frac{29a}{4}$ (5)
	$60\pi a^2\sigma$ (5)	$\bar{y}$

சமச்சீரின்படி புவியீர்ப்பு மையம் y அச்ச மீது இருக்கும். (5)

$$0 + 24\pi a^2 \sigma \times \frac{3a}{2} + \frac{80}{3} \pi a^2 \sigma \times \frac{43a}{9} - \frac{5}{3} \pi a^2 \sigma \times \frac{67a}{9} + 4\pi a^2 \sigma \times \frac{29a}{4} = 60\pi a^2 \sigma \bar{y} \quad (15)$$


$$36a + \left[\frac{80 \times 43 - 5 \times 67}{27} \right] a + 29a = 60\bar{y}$$

$$36a + 115a + 29a = 60\bar{y}$$

$$\bar{y} = 3a \quad (5)$$

$$\tan \theta = \frac{a}{4a + \frac{a}{2}} = \frac{2}{9} \quad (10)$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{2}{9} \right)$$



150

17. (a) விருந்து நிகழ்வு ஒன்றிற்கு வரும் விருந்தினர்களுக்கு *Coke, Pepsi* எனும் இருவகையான குளிர்பானங்களில் ஒன்று சிறிய ஒரு கேளிக்கை விளையாட்டின் ஊடாகத் தெரிவுசெய்யப்படுகின்றது. ஜோன் என்பவர் விருந்துக்குச் செல்லும்போது முதலில் ஒரு கோடாத சதுரமுகித் தாயக்கட்டையை எறியுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார். தாயக்கட்டையில் 1 விழுந்தால் குளிர்பானப்பெட்டி A யிலிருந்தும் 2 அல்லது 4 விழுந்தால் குளிர்பானப்பெட்டி B யில் இருந்தும் 3 அல்லது 5 அல்லது 6 விழுந்தால் குளிர்பானப் பெட்டி C யில் இருந்தும் ஓர் குளிர்பானப் போத்தலை எழுமாற்றாகத் தெரிய வேண்டும். ஜோன் சென்றவேளை குளிர்பானப் பெட்டிகளில் உள்ள குளிர்பானப் போத்தல்களின் எண்ணிக்கைகள் பின்வருமாறு உள்ளன.

A : 6-Coke, 4-Pepsi B : 3-Coke, 7-Pepsi C : 2-Coke, 3-Pepsi

ஜோன் விதிமுறைகளுக்கு அமைய தனக்கான குளிர்பானப் போத்தலைத் தெரிவுசெய்கின்றார். ஜோன் குளிர்பானப்பெட்டி A, B, C ஆகியவற்றைத் தெரிவதற்கான நிகழ்தகவுகளைத் தனித்தனியே காண்க.

ஜோன் *Coke* மீது அதிக விருப்பமுடையவர் எனின் அவர் விரும்பும் குளிர்பானப் போத்தலைப் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவை மொத்த நிகழ்தகவுத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி அல்லது வேறுவிதமாகக் காண்க.

ஜோன் தனக்கு விருப்பமான குளிர்பானப் போத்தலைப் பெற்றுக்கொண்டார் எனின் அது குளிர்பானப் பெட்டி A யிலிருந்து பெறப்பட்டிருப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.25 எனக்காட்டுக.

இதிலிருந்து ஜோன் விரும்பிய குளிர்பானத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார் எனின் அது குளிர்பானப்பெட்டி B அல்லது C யிலிருந்து பெறப்பட்டிருப்பதற்கான நிகழ்தகவை உய்த்தறிக.

A - குளிர்பானப்பெட்டி A தெரிவுசெய்யப்படல்

B - குளிர்பானப்பெட்டி B தெரிவுசெய்யப்படல்

C - குளிர்பானப்பெட்டி C தெரிவுசெய்யப்படல்

Co - ஜோன் *Coke* இனைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

Pe - ஜோன் *Pepsi* இனைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

$$P(A) = \frac{1}{6} \quad (5) \quad P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad (5) \quad P(C) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad (5)$$

$$P(Co | A) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P(Co | B) = \frac{3}{10}$$

$$P(Co | C) = \frac{2}{5}$$

மொத்த நிகழ்தகவு தேற்றம்:

$$P(Co) = P(Co | A) P(A) + P(Co | B) P(B) + P(Co | C) P(C) \quad (5)$$

$$= \frac{3}{5} \times \frac{1}{6} + \frac{3}{10} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} \quad (15)$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{2}{10} = \frac{4}{10} = 0.4 \quad (5)$$

பேயிசின் தேற்றப்படி

$$P(A | Co) = \frac{P(Co | A) P(A)}{P(Co)} \quad (5)$$

$$= \frac{\frac{3}{5} \times \frac{1}{6}}{\frac{4}{10}} = \frac{1}{4} = 0.25 \quad (5)$$

$$P(B \text{ அல்லது } C | Co)$$

$$= P(B \cup C | Co)$$

$$= P(A' | Co) \quad (\because P(A \text{ யிலிருந்து பெறப்படவில்லை)}) \quad (5)$$

$$= 1 - P(A | Co) = 1 - 0.25 = 0.75 \quad (5)$$

60

(b) $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ என்பது n எண்ணிக்கையான எண்கள் ஆகும். $Y \subset X$ ஆனது X இலிருக்கும் m எண்ணிக்கையான எண்களைக் கொண்ட தொடை ஆகும். Z ஆனது தொடை X இலிருந்து தொடை Y இல் உள்ள எண்களை நீக்குவதன் மூலம் பெறப்படுகின்றது. $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ எனவும் $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_{n-m}\}$ எனவும் கொள்க. தொடை X இன் இடை, நியம விலகல் முறையே μ_x, σ_x எனவும் தொடை Y இன் இடை, நியம விலகல் முறையே μ_y, σ_y எனவும் கொள்க.

தொடை Z இல் உள்ள $n-m$ எண்ணிக்கையான எண்களின் இடை $\mu_z = \frac{n\mu_x - m\mu_y}{n-m}$ எனக்காட்டுக.

மேலும் $d_1 = \mu_z - \mu_x$ எனின் $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_z)^2 = n(\sigma_x^2 + d_1^2)$ எனக் காட்டுக.

மேலும் $d_2 = \mu_z - \mu_y$ எனின் $\sum_{i=1}^m (y_i - \mu_z)^2$ இற்கு இயல்பொத்த கோவை ஒன்றை எழுதுக.

இதிலிருந்து $\sigma_z^2 = \frac{n(\sigma_x^2 + d_1^2) - m(\sigma_y^2 + d_2^2)}{n-m}$ என உய்த்தறிக்க.

அனு உலை ஒன்றின் வெளி வெப்பநிலை 120°C நாட்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அளக்கப்பட்டு அதன் இடை, நியம விலகல் என்பன முறையே $42^\circ\text{C}, 4^\circ\text{C}$ எனக் கணிக்கப்பட்டது. உபகரணங்களை சரிபார்க்க வந்த தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் வெப்பமானி பழுதடைந்திருப்பதை அவதானித்து இறுதி 20 நாட்களாகப் பெறப்பட்ட அளவிடு பிழையானது எனத் தெரிவிக்கின்றார். இறுதி 20 நாட்கள் பெறப்பட்ட பிழையான வாசிப்புகளின் இடை, நியம விலகல் முறையே $37^\circ\text{C}, 2^\circ\text{C}$ எனத் தரப்படின முதல் 100 நாட்களில் பெறப்பட்ட சரியான வாசிப்புகளின் இடை, நியம விலகல் ஆகியவற்றைக் காண்க.

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \mu_x \quad (5) \quad \frac{\sum_{i=1}^m y_i}{m} = \mu_y \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^{n-m} z_i = \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^m y_i = n\mu_x - m\mu_y \quad (10)$$

$$\mu_z = \frac{\sum_{i=1}^{n-m} z_i}{n-m} = \frac{n\mu_x - m\mu_y}{n-m}$$

$$\sigma_x^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_x)^2}{n} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_z)^2 &= \sum_{i=1}^n ((x_i - \mu_x) + (\mu_x - \mu_z))^2 \quad (5) \\ &= \sum_{i=1}^n ((x_i - \mu_x) + d_1)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 + 2d_1(x_i - \mu_x) + d_1^2 \quad (5) \\ &= n\sigma_x^2 + 2d_1 \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mu_x \right) + nd_1^2 \quad (5) \\ &= n\sigma_x^2 + 2d_1(n\mu_x - n\mu_x) + nd_1^2 \\ &= n(\sigma_x^2 + d_1^2) \quad (5) \end{aligned}$$

$$\text{இதேபோல் } \sum_{i=1}^m (y_i - \mu_z)^2 = m(\sigma_y^2 + d_2^2) \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-m} (z_i - \mu_z)^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_z)^2 - \sum_{i=1}^m (y_i - \mu_z)^2 \quad (5) \\ &= n(\sigma_x^2 + d_1^2) - m(\sigma_y^2 + d_2^2) \quad (5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sigma_z^2 &= \sum_{i=1}^{n-m} \frac{(z_i - \mu_z)^2}{n-m} \quad (5) \\ &= \frac{n(\sigma_x^2 + d_1^2) - m(\sigma_y^2 + d_2^2)}{n-m} \quad (5) \end{aligned}$$

$X - 120$ நாள் தரவுகள்

$Y - 20$ நாள் பிழையான தரவுகள்

$Z - 100$ நாள் சரியான தரவுகள்

$$\mu_x = 42^\circ C, \quad \sigma_x = 4^\circ C$$

$$\mu_y = 37^\circ C, \quad \sigma_y = 2^\circ C$$

$$\mu_z = \frac{120 \times 42 - 20 \times 37}{100} = 43^\circ C \quad (10)$$

$$d_1 = 1^\circ C$$

$$d_2 = 6^\circ C$$

$$\sigma_z^2 = \frac{120(4^2 + 1^2) - 20(2^2 + 6^2)}{100} = 12.4 \quad (10) \Rightarrow \sigma_z = \sqrt{12.4} = 3.52^\circ C$$
